

В'ЯЗКІСНІ ТА ТРОМБОЦИТАРНО-АГРЕГАЦІЙНІ ПОРУШЕННЯ У ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА ЗІ СТІЙКОЮ ЕЛЕВАЦІЄЮ СЕГМЕНТУ ST

Узун Д. Ю., Лазоришинець В. В., Узун К. С.

Резюме. Клінічні дослідження вказують на значну роль в патогенезі розвитку гострого інфаркту міокарда функціонального стану агрегації тромбоцитів і в'язкості крові, які визначають характер плинності крові по судинах на рівні макро- і мікроциркуляції.

Мета дослідження полягала в аналізі змін в'язкісних та тромбоцитарно-агрегаційних порушень під впливом різних тактичних, діагностичних і інтервенційних підходів у хворих на інфаркт міокарда із стійкою елевацією сегменту ST при наявності мультисудинного ураження коронарних артерій.

Матеріали та методи. В дослідженні використано 4 тактичні і лікувально-діагностичні підходи протягом року спостереження.

Результати. Виявилось, що у хворих на інфаркт міокарду із стійкою елевацією сегменту ST встановлено гіперв'язкий і гіперкоагуляційний синдроми, які проявлялися в перші тижні компенсаторним зростанням кількості тромбоцитів, в'язкості крові, рівня фібриногену, та зростанням агрегаційних властивостей тромбоцитів.

Висновки. Проведення додаткового поглибленого обстеження коронарного кровообігу (когерентної томографії і внутрішньосудинної сонографії) як основних методів детального оцінювання стану атероматозного процесу та подальше застосування відтермінованого стентування інфарктнезалежних артерій в групі І, сприяло меншій амплітуді коливань всіх лабораторних показників порівняно з іншими тактичними і лікувальними підходами, а, відтоді, завдяки системному етапному поліпшенню артеріального кровопостачання, оптимізувати стан в'язкості і процесів адгезії/агрегації тромбоцитів. Традиційні тактичні та лікувально-діагностичні принципи ведення такої категорії хворих не дозволяють принципово поліпшити стан в'язкісних і коагуляційно-агрегаційних параметрів навіть при використанні подвійної антиагрегантної терапії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: лікувально-діагностичні підходи, циркуляція крові, гіперв'язкий і гіперкоагуляційний синдроми, атероматозний процес, тромбоцити

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Узун Дмитро Юрійович, к. мед. н., завідувач відділення серцево-судинної та рентгеноваскулярної хірургії з блоком інтервенційної нейрорадіології, обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ, вул. Олексі Тихого, 31, Краматорськ, Україна, 83907; e-mail: uzun7248-1@unesp.co.uk, <https://orcid.org/0000-0002-9167-6430>

Лазоришинець Василь Васильович, д. мед. н., директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України, вул. Амосова, 6, Київ, Україна, 03038; e-mail: lazoryshynets7248-1@uoel.uk, <https://orcid.org/0000-0002-1748-561X>

Узун Катерина Сергіївна, лікар-кардіолог, відділення серцево-судинної та рентгеноваскулярної хірургії з блоком інтервенційної нейрорадіології, обласне територіальне медичне об'єднання м. Краматорськ, вул. Олексі Тихого, 31, Краматорськ, Україна, 83907; e-mail: kat.uzun7248-1@murdoch.in, <https://orcid.org/0000-0001-6179-4324>

ВСТУП

Клінічні дослідження вказують на значну роль в патогенезі розвитку гострого інфаркту міокарда (ІМ) функціонального стану агрегації тромбоцитів і в'язкості крові, які визначають характер плинності крові по судинах на рівні макро- і мікроциркуляції [1; 2]. Гострий біль у інфарктних пацієнтів являє собою один з механізмів, що лежить в основі як рефлекторного спазму вінцевих судин, так

і сприяє стрімкому зростанню чисельності тромбоцитів в периферичній крові [3]. При розриві атероматозної бляшки насамперед відбувається адгезія тромбоцитів до субендотеліальних структур артерії [4]. Активація тромбоцитів супроводжується вивільненням з них біологічно активних речовин (аденозиндифосфату, тромбоксану, серотоніну), під впливом яких на поверхні мембрани тромбоцита утворюються глікопротеїдні П₂У₁ рецептори, які на завершальному етапі

агрегації тромбоцитів відіграють ключову роль в процесі тромбоутворення, створюючи утворенню «містків» між тромбоцитами і адгезивними білками, перш за все фібриногеном. Ось чому, дослідження сироваткового рівня фібриногену є також важливим для цієї категорії хворих [3].

Приблизно у половини хворих на ІМ із стійкою елевацією сегменту ST за результатами ангиографічного дослідження виявляють мультисудинне атеросклеротичне ураження вінцевих артерій. Традиційним підходом до лікування таких хворих є стентування інфарктзалежної артерії, але часто без урахування ступеня ураження інших, так званих інфарктнезалежних судин. До того ж, часто при коронарографії буває складно оцінити не лише їх прохідність, але й істинні розміри і структуру атерому, а також морфологічний стан ендотелію [5]. А через це діагностична і лікувальна тактика у такої категорії хворих багато в чому залишається не тільки не вирішеною остаточно, алей здебільше суб'єктивною [2; 6–8].

Реологічні властивості крові залежать від співвідношення обсягу плазми/обсягу формених елементів, концентрації плазмових білків, форми і розмірів еритроцитів, швидкості кровотоку. В'язкість є дуже важливим показником стану крові, оскільки суттєво впливає на процеси тканинного метаболізму. Підвищення в'язкості обумовлює зниження швидкості дифузії і електропровідності клітин. В'язкість крові підвищується внаслідок агрегації еритроцитів і тромбоцитів, на яку в свою чергу значно впливають і інші реологічні параметри, в тому числі поверхневий заряд мембрани і плазмова концентрація фібриногену [9; 10]. Підвищення в'язкості крові спостерігається при збільшенні кількості клітин щодо об'єму плазми. Це відзначається при підвищенні концентрації високомолекулярних білків (перш за все фібриногену) та веде до зростання периферичного судинного опору і зростання навантаження на ліві відділу серця [11]. В'язкість крові пов'язана з основними факторами ризику розвитку кардіоваскулярної патології, включаючи артеріальну гіпертензію,

гіперліпідемію, цукровий діабет, метаболічний синдром, приналежність до чоловічої статі і вік. До того ж, підвищений вихідний рівень фібриногену в плазмі крові можна вважати предиктором розвитку серцево-судинних подій [3; 12–14].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження полягає в аналізі змін в'язкісних та тромбоцитарно-агрегаційних порушень під впливом різних тактичних, діагностичних і інтервенційних підходів у хворих на ІМ із стійкою елевацією сегменту ST при наявності мультисудинного ураження коронарних артерій.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Згідно критеріїв включення і виключення, до дослідження увійшли 102 хворих на ІМ із стійкою елевацією сегменту ST, які методом випадкової вибірки були розподілені в 4 статистично гомогенні групи, однотипні за статтю ($\chi^2 = 0.9$, $p = 0.34$), віком ($t = 2.3$, $p = 0.14$), тривалістю ІМ ($t = 0.9$, $p = 0.88$), клінічними проявами захворювання ($\chi^2 = 2.3$, $p = 0.14$), стадією хронічної серцевої недостатності ($\chi^2 = 1.50$, $p = 0.32$). Критерії включення: ІМ із стійкою елевацією сегменту ST, мультисудинне атеросклеротичне ураження коронарних артерій; ангиографічно значимий стеноз коронарних судин більше 50–70 %, мінімум в 2 проєкціях; функціонально значимий стеноз вінцевих артерій за даними фракційного резерву кровотоку (ФРК) (< 0.80). Критерії виключення/не включення: ІМ без стійкого підйому сегменту ST (за SYNTAX Score > 32 балів); хворі на ІМ із стійкою елевацією сегменту ST, яким раніше виконано аортокоронарне шунтування; ІМ з елевацією сегменту ST без явного стенозу; функціонально не значущий стеноз коронарних артерій за даними ФРК (> 0.84); гостра серцева недостатність; кардіогенний шок класів 3–4 по Killip; аневризма лівого шлуночка; протези клапанів серця; пароксизмальна або постійна форма фібриляції передсердь; ниркова недостатність; цукровий діабет.

До 1-ї (основної) групи включено 25 (24.5 %) хворих, яким за допомогою

коронароангіографії встановлено наявність оклюзії інфарктзалежної судини та виконано її термінове стентування. Надалі на 2–3 добу проведено ФРК і доведена наявність у них гемодинамічно значущих стенозів інфарктнезалежних артерій. Після виконання оптичної когерентної томографії (ОКТ) оцінена стабільність, розміри, протяжність атероми та виконано відтерміноване стентування цих судин. До 2-ї групи включено 26 (25.5 %) хворих, яким виконано стентування інфарктзалежної артерії, а на 2–3-ю добу – ФРК, але без ОКТ з наступним стентуванням інфарктнезалежної (-их) артерії (-ій). До 3-ї групи увійшли 25 (24.5 %) хворих, яким проведено одномоментне стентування інфарктзалежних і інфарктнезалежних судин після коронарографії. До 4-ї групи включено 26 (25.5 %) пацієнтів, яким виконано лише стентування інфарктзалежної судини, які були виписані з відділення без подальшого дослідження стану кровообігу в інфарктнезалежних артеріях і інтервенційних втручань на них. Всі хворі отримували стандартну двокомпонентну антитромбоцитарну терапію (ацетилсаліцилова кислота 75–150 мг/добу і клопідогрел 75 мг/добу) і отримували 20 мг аторвастатину і 10 мг езетимібу.

Отримані у хворих результати порівнювали із аналогічними у 30 практично здорових людей аналогічного віку і статі. За допомогою рутинних методик визначали кількість тромбоцитів в периферичній крові (Тр) і концентрацію фібриногену (Ф). За допомогою віскозиметра та лазерного агрегометра «Viola» (Росія) оцінювали ступінь адгезії тромбоцитів (САДТр), час адгезії тромбоцитів (ЧАТр), ступінь агрегації тромбоцитів (САГТр) та в'язкість крові. Всі досліджувані показники вивчали тричі – в першу добу ІМ, через 3–4 тижні та через рік. Статистична обробка даних проводилася на персональному комп'ютері з використанням пакета ліцензійної програми для статистичного аналізу «Statistica 6.0». Перевірку на нормальність розподілу проводили за допомогою методу Шапіро-Вілка. Вибірка мала нормальний розподіл. Для зіставлення

кількісних параметрів між незалежними вибірками використовували непарний критерій Стьюдента (t). Для співставлення результатів на різних етапах лікування одної групи використовували парний критерій Стьюдента з урахуванням його параметрів, прийнятих в медико-біологічних дослідженнях. Для співставлення якісних показників використовували критерій χ^2 . Відмінності між порівнюваними показниками вважали статистично достовірними при рівні значущості $p < 0.05$.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Визначення в'язкості крові у хворих на ІМ порівняно із здоровими людьми продемонструвало двократний приріст величини цього показника. При спостереженні в динаміці виявилось, що в 1-ій групі на 2-му етапі дослідження (тобто через 3–4 тижні) величина показника в'язкості зріс вдвічі, та надалі (через рік) він статистично достовірно зменшився, але так і не досяг аналогічної величини в групі контролю. В групі 3 зміни показника в'язкості крові були аналогічними. В групі 2 приріст величини в'язкості крові між 1-ю добою і 3–4 тижнем з моменту розвитку ІМ виявився меншим, ніж в групах 3 і 4, але спрямованість змін була однотипною. В групі 1 приріст в'язкості на 3–4 тижні був статистично достовірним, але меншим за групи 2, 3 і 4. Через рік величина в'язкості крові була найменшою серед всіх груп хворих і вона максимально наблизилася до групи здорових.

У дослідженої категорії визначена вихідна гіперфібриногенемія, що значуще відрізнялася від здорових. На тлі лікування в групі 4 визначалося спочатку не достовірне зростання, а надалі й достовірне зниження по відношенню до 2-го етапу дослідження (через 3–4 тижні). Аналогічний тренд мав місце в групі 3. В групі 2 через рік величина показника наблизилася до здорових. В групі 1 спочатку спостерігали тенденцію до збільшення, а надалі, статистично достовірний регрес до рівня, що дорівнював здоровим (табл. 1).

**Сироваткова концентрація маркерів ендотеліальної функції судин у хворих на ІМ
із стійкою елевацією сегменту ST в динаміці спостереження і у здорових (M ± m)**

| Етапи | Групи хворих | | | | Здорові (n = 30) |
|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | 1-а (n = 25) | 2-а (n = 26) | 3-я (n = 25) | 4-а (n = 26) | |
| В'язкість крові (M ± m, ум. од. в'язкості) | | | | | |
| 1-а доба | 24.6 ± 0.08 ¹ | 23.5 ± 0.07 | 23.8 ± 0.11 | 23.8 ± 0.06 ¹ | 10.5 ± 0.09 |
| 3-4 тижні | 30.1 ± 0.07 ¹⁸ | 32.0 ± 0.09 ⁸ | 44.0 ± 0.15 ⁵⁸ | 44.0 ± 0.10 ⁴¹⁶ | |
| 1 рік | 14.3 ± 0.10 ¹⁹¹⁰ | 17.0 ± 0.17 ⁹¹⁰ | 19.0 ± 0.12 ⁵⁹¹⁰ | 18.7 ± 0.18 ¹⁴⁶⁹¹⁰ | |
| Фібриноген (M ± m, г/л) | | | | | |
| 1-а доба | 6.4 ± 0.03 ¹ | 6.4 ± 0.07 ¹ | 6.4 ± 0.03 ¹ | 6.4 ± 0.01 ¹ | 5.2 ± 0.04 |
| 3-4 тижні | 6.5 ± 0.02 ¹ | 6.5 ± 0.02 ¹ | 6.8 ± 0.02 ¹ | 6.9 ± 0.04 ¹ | |
| 1 рік | 5.4 ± 0.01 ¹⁹¹⁰ | 5.8 ± 0.01 ¹⁹¹⁰ | 6.0 ± 0.05 ¹³¹⁰ | 6.0 ± 0.05 ¹⁴¹⁰ | |
| Тр (10 ⁹ /л) | | | | | |
| 1-а доба | 340.1 ± 1.50 ¹ | 341.2 ± 1.33 ¹ | 339.4 ± 1.21 ¹ | 340.4 ± 1.16 ¹ | 322.4 ± 1.25 |
| 3-4 тижні | 353.9 ± 1.29 ¹⁸ | 356.1 ± 1.24 ¹⁸ | 360.4 ± 1.17 ¹³⁵⁸ | 363.2 ± 1.24 ¹⁴⁶⁷ | |
| 1 рік | 327.8 ± 1.16 ¹⁹¹⁰ | 327.2 ± 1.19 ¹⁹¹⁰ | 329.0 ± 1.09 ¹³⁹¹⁰ | 328.0 ± 1.38 ¹⁹¹⁰ | |
| САДТр, (%) | | | | | |
| 1-а доба | 39.0 ± 0.10 ¹ | 39.1 ± 0.24 ¹ | 39.1 ± 0.12 ¹ | 39.4 ± 0.40 ¹ | 19.2 ± 0.13 |
| 3-4 тижні | 36.7 ± 0.17 ¹⁸ | 40.0 ± 0.18 ¹ | 43.6 ± 0.22 ¹³⁵⁸ | 43.8 ± 0.39 ¹⁴⁶ | |
| 1 рік | 23.1 ± 0.13 ¹⁹¹⁰ | 26.3 ± 0.20 ¹²⁹¹⁰ | 30.1 ± 0.34 ¹³⁵⁹¹⁰ | 30.4 ± 0.18 ¹⁴⁶⁹¹⁰ | |
| ЧАТр, (мин) | | | | | |
| 1-а доба | 3.4 ± 0.01 ¹ | 3.4 ± 0.03 ¹ | 3.5 ± 0.02 ¹ | 3.4 ± 0.02 ¹ | 7.1 ± 0.02 |
| 3-4 тижні | 3.0 ± 0.02 ¹ | 2.8 ± 0.02 ¹⁸ | 2.5 ± 0.02 ¹³⁸ | 2.2 ± 0.03 ¹⁴ | |
| 1 рік | 5.9 ± 0.01 ¹⁹¹⁰ | 4.9 ± 0.04 ¹²⁹¹⁰ | 4.5 ± 0.04 ¹³⁹¹⁰ | 4.3 ± 0.05 ¹⁴⁶⁹¹⁰ | |
| САГТр, (%) | | | | | |
| 1-а доба | 57.4 ± 0.18 ¹ | 57.7 ± 0.10 ¹ | 56.9 ± 0.20 ¹ | 57.6 ± 0.12 ¹ | 44.3 ± 0.12 |
| 3-4 тижні | 58.7 ± 0.20 ¹ | 59.4 ± 0.15 ¹⁸ | 62.1 ± 0.31 ¹³⁵⁸ | 62.0 ± 0.19 ¹⁴⁶ | |
| 1 рік | 46.0 ± 0.24 ¹⁹¹⁰ | 49.6 ± 0.19 ¹²⁹¹⁰ | 50.2 ± 0.11 ¹³⁹¹⁰ | 51.3 ± 0.24 ¹⁴⁶⁹¹⁰ | |

Примітка: ¹ – відмінності між аналогічними показниками у хворих і здорових статистично достовірні; ² – відмінності між аналогічними показниками у хворих 1-ї і 2-ї груп статистично достовірні; ³ – відмінності між аналогічними показниками у хворих 1-ї і 3-ї груп статистично достовірні; ⁴ – відмінності між аналогічними показниками у хворих 1-ї і 4-ї груп статистично достовірні; ⁵ – відмінності між аналогічними показниками у хворих 2-ї і 3-ї груп статистично достовірні; ⁶ – відмінності між аналогічними показниками у хворих 2-ї і 4-ї груп статистично достовірні; ⁷ – відмінності між аналогічними показниками у хворих 3-ї і 4-ї груп статистично достовірні; ⁸ – відмінності між аналогічними показниками у хворих на 1-ій добі та через 3-4 тижня; ⁹ – відмінності між аналогічними показниками у хворих на 1-ій добі і через рік статистично достовірні; ¹⁰ – відмінності між аналогічними показниками у хворих через 3-4 тижня і через рік статистично достовірні.

Вихідна кількість тромбоцитів у хворих була статистично достовірно вищою за нормативні показники, що можливо доцільно розглядати з позиції компенсаторної реакції на інфарктну біль. В подальшому в групі 4 рівень тромбоцитів зріс і лише через рік знизився до норми. Аналогічний тренд спостерігався в групах 2 і 3, хоча в групах 1 і 2 тромбоцитоз був нижчим за групи 3 і 4. У всіх групах хворих через рік було

досягнуто нормальні значення чисельності тромбоцитів. Вихідні значення САДТр у хворих виявилися статистично достовірно вищими за здорових та на тлі лікування. В групі 4 відбувалося спочатку достовірно зростання, а наділі зниження, яке так і не досягло відповідного значення в контрольній групі. В групі 3 спостерігалася аналогічна тенденція. В групі 2 зміни були аналогічними. Збільшення САДТр між 1-им і 2-им

етапами було статистично меншим за аналогічні показники в групах 3 і 4, але на етапі 3 величина досліджуваного показника так і не знизилася до рівня здорових, хоча і набула статистично достовірних відмінностей із групами 3 і 4. В групі 1, на відміну від інших груп хворих спостерігалось вірогідне зниження САДТр як між етапом 1 і 2, так і етапами 2 і 3. В цій групі величина САДТр виявилася найменшою через рік серед всіх груп хворих. Між тим, досліджувана величина так і не знизилася до відповідного значення в контролі.

Величина ЧАТр у хворих виявилася меншою за здорових, тобто активація тромбоцитів відбувалася за менший проміжок часу, ніж у здорових. В групах і-4 ЧАТр спочатку зменшився між 1-ю добою і 3-4 тижнями, а надалі навпаки збільшився. Якщо в групах 2, і 4 між етапами 1 і 2 було отримано статистично достовірні відмінності, то в групі 1 – ні. Навпаки, між етапами 2 і 3 во всіх групах хворих встановлена достовірна відмінність. Найвищий приріст відзначено в групах 1 і 2, а в групах 3 і 4 – навпаки, вірогідне зниження. Зміни САДТр в динаміці спостереження нагадують зміни САДТр. Спочатку показник статистично достовірно зростав, а надалі знижувався. Така закономірність прослідковується в групах 3 і 4. В групі 1 і 2 зростання мало характер тенденції. При цьому в жодній з груп хворих на фінальному етапі дослідження було встановлено статистично достовірні відмінності від групи контролю, тобто в жодній з груп хворих, величина САДТр не досягла значення, відповідного до норми.

Вважають, що збільшення в'язкості крові у хворих на ІМ обумовлено комплексом різноманітних змін: підвищенням агрегації еритроцитів і тромбоцитів, вмістом фібриногену крові, чисельності грубодисперсних білкових з'єднань, рівнями тригліцеридів, холестерину, жирних кислот та зміною мембранного потенціалу еритроцитів [5]. Останні роки до цього переліку додали декілька факторів, що визначаються порушеним станом гідро-іонної рівноваги, що формується як на тлі гіперперфузійних розладів, так і порушень системної гемодинаміки і зниження плазмової

частини, ніж глобулярної із гемоконцентрацією, що в сукупності приводить до підсилення/формування гіперв'язкого синдрому, що у свою чергу погіршує систолічні властивості лівого шлуночка [4]. До того ж, приблизно у 50 % випадків ІМ виникає без явної діс-/гіперліпідемії, а у приблизно 20 % – при відсутності будь-яких класичних факторів ризику ІХС. Класичним механізмом в цих випадках вважають спазм вінцевих судин. Ймовірною причиною, за якою патогенез хронічних судинних захворювань, в тому числі атеросклерозу, артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому, що не завжди пояснюється класичними теоріями патогенезу, може бути обумовлений саме порушеннями в'язкості та агрегаційними порушеннями формених елементів крові [15].

Коли в результаті внутрішньо судинного втручання або розриву нестабільної атеросклеротичної бляшки відбувається ушкодження стінки судини, циркулюючі тромбоцити першими з усіх клітинних елементів зв'язуються з субендотеліальним матриксом, формуючи тромб. Накопичення тромбоцитів в місцях пошкодження стінки судини визначається розвитком специфічних взаємодій: тромбоцит – стінка судини (адгезія), тромбоцит – тромбоцит (агрегація) і тромбоцит – лейкоцит (аглотинація), які регулюються цілим рядом поверхневих і розчинних білків. Накопичуючись в зоні пошкодження, активовані тромбоцити виявляються здатними не тільки брати участь у розвитку тромбу, а й ініціювати і/або прискорювати запальні процеси в стінці судини [11]. Поява в кровотоці тромбоцитарно-лейкоцитарних агрегатів сприяє розвитку локального запалення і подальшого захоплення лейкоцитів судинною стінкою. Поява в периферичній крові у пацієнтів з ІХС великої кількості таких агрегатів може бути як важливим компонентом системного запалення, так і одним із шляхів індукування запальних процесів в стінці судини (інтими або стабільній атеромі), які можуть призводити до прискорення розвитку атеросклеротичного ушкодження і атеротромбозу [11]. Первинна взаємодія тромбоцитів з пошкодженою стінкою судини є пусковим механізмом, який

ініціює накопичення тромбоцитів в місці пошкодження. Подальше формування оклюзуючого тромбу у великій мірі залежить як від адгезивних властивостей тромбоцитів, так і від здатності тромбоцитів швидко реагувати на активуючі стимули [11].

ВИСНОВКИ

1. У хворих на ІМ із стійкою елевацією сегменту ST встановлено гіперв'язкий і гіперкоагуляційний синдроми, які проявлялися в перші тижні компенсаторним зростанням кількості тромбоцитів, в'язкості крові, рівня фібриногену, та зростанням агрегаційних властивостей тромбоцитів.

2. Проведення додаткового поглибленого обстеження коронарного кровообігу (когерентної томографії і

внутришньосудинної сонографії) як основних методів детального оцінювання стану атероматозного процесу та подальше застосування відтермінованого стентування інфарктнезалежних артерій в групі 1, сприяло меншій амплітуді коливань всіх лабораторних показників порівняно з іншими тактичними і лікувальними підходами, а, відтоді, завдяки системному етапному поліпшенню артеріального кровопостачання, оптимізувати стан в'язкості і процесів адгезії/агрегації тромбоцитів.

3. Традиційні тактичні та лікувально-діагностичні принципи ведення такої категорії хворих не дозволяють принципово поліпшити стан в'язкісних і коагуляційно-агрегаційних параметрів навіть при використанні подвійної антиагрегантної терапії.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Габбасов З. А. Фенотип тромбоцитов и инфаркт миокарда. Креативная кардиология. 2014; 2: 48–59. https://cardiology-journal.com/catalog/detail.php?SECTION_ID=971&ID=18348
2. Никифоров В. С. Вязкость крови как мишень терапевтического воздействия при сердечно-сосудистой патологии. Фарматека. 2015; 13: 59–62. <https://pharmateca.ru/en/archive/article/31900>
3. Корякина Л. Б., Пивоваров Ю. И., Курильская Т. Е. Дисфункция сосудистого эндотелия при артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Бюлетень ВСНЦ СО РАМН. 2013; 2 (90): 165–170. <https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/1550>
4. Jagpal A., Navarro-Millán I. Cardiovascular co-morbidity in patients with rheumatoid arthritis: A narrative review of risk factors, cardiovascular risk assessment and treatment. BMC Rheumatology. 2018; 2 (1): 10. <https://doi.org/10.1186/s41927-018-0014-y>
5. Лысенко Г. И. Роль клопидогреля в профилактике сердечно-сосудистых катастроф. Мистецтво лікування. 2011; 3 (79): 58–63. <https://www.health-medix.com/articles/mistetzvo/2011-04-11/11GILSSK.pdf>
6. Bonin M., Mewton N., Roubille F., Boussaha I., Derumeaux G. Effect and safety of morphine use in acute anterior ST-segment elevation myocardial infarction. Journal of the American Heart Association. 2018; 7 (4): e006833. <https://doi.org/10.1161/JAHA.117.006833>
7. Harrington D. H., Stueben F., Lenahan C. M. ST-elevation myocardial infarction and non-ST-elevation myocardial infarction: Medical and surgical interventions. Critical Care Nursing Clinics of North America. 2019; 31 (1): 49–64. <https://doi.org/10.1016/j.cnc.2018.10.002>
8. Baek J. Y., Kang T. S., Rha S-W, Park S. H., Jeong M. H. Twelve-month clinical outcomes of acute non-ST versus ST-segment elevation myocardial infarction patients with reduced preprocedural thrombolysis in myocardial infarction flow undergoing percutaneous coronary intervention. Coronary Artery Disease. 2018; 29 (5): 416–422. <https://doi.org/10.1097/MCA.0000000000000632>
9. Thygesen K., Alpert J. S., Jaffe A. S., Chaitman B. R., Bax J. J., Morrow D. A., White H. D., Parkhomenko A. Fourth universal definition of myocardial infarction. Circulation. 2018; 138 (20): e618–e651. <https://www.acc.org/latest-in-cardiology/ten-points-to-remember/2018/08/24/00/09/fourth-universal-definition-of-mi-esc-2018>
10. Yang S-H, Du Y., Zhang Y., Sun J., Li J-J. Serum fibrinogen and cardiovascular events in Chinese patients with type 2 diabetes and stable coronary artery disease: A prospective observational study. British Medical Journal. 2017; 7(6): 123-125. <https://bmjopen.bmj.com/content/7/6/e015041>
11. Parizadeh SM, Jafarzadeh-Esfehani R, Ghandehari M, Parizadeh MR, Ferns GA, Avan A, Hassanian SM. Stem cell therapy: A novel approach for myocardial infarction. Journal of Cellular Physiology. 2019; 234 (10): 16904–16912. <https://doi.org/10.1002/jcp.28381>

12. Pandey A. K., Duong T., Swiatkiewicz I., Daniels L. B. A comparison of biomarker rise in type 1 and type 2 myocardial infarction. *American Journal of Medicine*. 2020; 33 (10): 1203–1208. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2020.02.024>
13. András J., Gergely E., Péter P. F., Péter O., Péter A. Prognostic significance of the total ischemic time in patients with ST-elevation myocardial infarction. *Orvosi Hetilap*. 2018; 159 (27): 1113–1120. <https://doi.org/10.1556/650.2018.31108>
14. Caimi G., Hopps E., Montana M., Canino B., Lo Presti R. Analysis of the blood viscosity behavior in the Sicilian study on juvenile myocardial infarction. *Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis*. 2018; 24 (8): 1276–1281. <https://doi.org/10.1177/1076029618775511>
15. Clemetson K. J. Platelet receptors. In: A. D. Michelson (Ed.), *Platelets* (pp. 169–194). San Diego: Elsevier Academic Press; 2013.

REFERENCES

1. Gabbasov ZA. Platelet phenotype and myocardial infarction. *Creative Cardiology*. 2014; 2: 48–59 [in Russian]. https://cardiology-journal.com/catalog/detail.php?SECTION_ID=971&ID=18348
2. Nikiforov VS. Blood viscosity as a target of therapeutic effects in cardiovascular pathology. *Farmateka*. 2015; 13: 59–62 [in Russian]. <https://pharmateka.ru/en/archive/article/31900>
3. Koryakina LB, Pivovarov YuI, Kurilskaya TE. Dysfunction of the vascular endothelium in arterial hypertension and coronary heart disease. *Bulletin of the All-Russian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences*. 2013; 2 (90): 165–170 [in Russian]. <https://www.actabiomedica.ru/jour/article/view/1550>
4. Jagpal A, Navarro-Millán I. Cardiovascular co-morbidity in patients with rheumatoid arthritis: A narrative review of risk factors, cardiovascular risk assessment and treatment. *BMC Rheumatology*. 2018; 2 (1): 10. <https://doi.org/10.1186/s41927-018-0014-y>
5. Lysenko GI. The role of clopidogrel in the prevention of cardiovascular catastrophes. *Mistake of Likuvannya*. 2011; 3 (79): 58–63 [in Russian]. <https://www.health-medix.com/articles/misteztvo/2011-04-11/11GILSSK.pdf>
6. Bonin M, Mewton N, Roubille F, Boussaha I, Derumeaux G. Effect and safety of morphine use in acute anterior ST-segment elevation myocardial infarction. *Journal of the American Heart Association*. 2018; 7 (4): e006833. <https://doi.org/10.1161/JAHA.117.006833>
7. Harrington DH, Stueben F, Lenahan CM. ST-elevation myocardial infarction and non-ST-elevation myocardial infarction: Medical and surgical interventions. *Critical Care Nursing Clinics of North America*. 2019; 31 (1): 49–64. <https://doi.org/10.1016/j.cnc.2018.10.002>
8. Baek JY, Kang TS, Rha S-W, Park SH, Jeong MH. Twelve-month clinical outcomes of acute non-ST versus ST-segment elevation myocardial infarction patients with reduced preprocedural thrombolysis in myocardial infarction flow undergoing percutaneous coronary intervention. *Coronary Artery Disease*. 2018; 29 (5): 416–422. <https://doi.org/10.1097/MCA.0000000000000632>
9. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, Chaitman BR, Bax JJ, Morrow DA, White HD, Parkhomenko A. Fourth universal definition of myocardial infarction. *Circulation*. 2018; 138 (20): e618–e651. <https://www.acc.org/latest-in-cardiology/ten-points-to-remember/2018/08/24/00/09/fourth-universal-definition-of-mi-esc-2018>
10. Yang S-H, Du Y, Zhang Y, Sun J, Li J-J. Serum fibrinogen and cardiovascular events in Chinese patients with type 2 diabetes and stable coronary artery disease: A prospective observational study. *British Medical Journal*. 2017; 7 (6): 123–125. <https://bmjopen.bmj.com/content/7/6/e015041>
11. Parizadeh SM, Jafarzadeh-Esfehani R, Ghandehari M, Parizadeh MR, Ferns GA, Avan A, Hassanian SM. Stem cell therapy: A novel approach for myocardial infarction. *Journal of Cellular Physiology*. 2019; 234 (10): 16904–16912. <https://doi.org/10.1002/jcp.28381>
12. Pandey AK, Duong T, Swiatkiewicz I, Daniels LB. A comparison of biomarker rise in type 1 and type 2 myocardial infarction. *American Journal of Medicine*. 2020; 133 (10): 1203–1208. <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2020.02.024>
13. András J, Gergely E, Péter PF, Péter O, Péter A. Prognostic significance of the total ischemic time in patients with ST-elevation myocardial infarction. *Orvosi Hetilap*. 2018; 159 (27): 1113–1120. <https://doi.org/10.1556/650.2018.31108>
14. Caimi G, Hopps E, Montana M, Canino B, Lo Presti R. Analysis of the blood viscosity behavior in the Sicilian study on juvenile myocardial infarction. *Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis*. 2018; 24 (8): 1276–1281. <https://doi.org/10.1177/1076029618775511>
15. Clemetson KJ. Platelet receptors. In: A.D. Michelson (Ed.), *Platelets* (pp. 169–194). San Diego: Elsevier Academic Press; 2013.

VISCOSE AND THROMBOCYTIC-AGGREGATION DISORDERS ON PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION WITH STABLE ELEVATION OF ST SEGMENT

Uzun D. U., Lazoryshynets V. V., Uzun K. S.

Abstract. Clinical studies indicate a significant role in the pathogenesis of acute myocardial infarction, the functional state of platelet aggregation and blood viscosity, which determine the nature of blood flow in the vessels at the level of macro- and microcirculation.

The aim of the study was to analyze changes in viscosity and platelet-aggregation disorders under the influence of different tactical, diagnostic and interventional approaches in patients with myocardial infarction and stable elevation of the ST segment in the presence of multivascular coronary artery disease.

Materials and methods. The study used 4 tactical and treatment-diagnostic approaches during the year of observation.

Results. Patients with myocardial infarction with persistent ST-segment elevation were found to have hyperviscosity and hypercoagulability syndromes, manifested in the first weeks by a compensatory increase in platelet count, blood viscosity, fibrinogen levels, and an increase in platelet aggregation.

Conclusions. Carrying out additional in-depth examination of coronary circulation (coherent tomography and intravascular sonography) as the main methods of detailed assessment of atheromatous process and further application of delayed stenting of infarct-independent arteries in group 1, contributed to lower amplitude of fluctuations, due to the systemic step-by-step improvement of arterial blood supply, to optimize the state of viscosity and processes of adhesion / aggregation of platelets. Traditional tactical and medical-diagnostic principles of this category of patients do not allow to fundamentally improve the state of viscosity and coagulation-aggregation parameters, even with the use of dual antiplatelet therapy.

KEY WORDS: treatment-diagnostic approaches, blood circulation, hyperviscosity and hypercoagulability syndromes, atheromatous process, platelets

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Uzun Dmitriy, PhD in Medical Sciences, Head of the Department of Cardiovascular and X-ray Vascular Surgery with Interventional Neuroradiology Unit, Kramatorsk Regional Territorial Medical Association, 31, O. Tykhyi Str., Kramatorsk, Ukraine, 83907; e-mail: uzun7248-1@unesp.co.uk, <https://orcid.org/0000-0002-9167-6430>

Lazoryshynets Vasyi, Full Doctor in Medical Sciences, Director of the Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, 6, Amosov Str., Kyiv, Ukraine, 03038; e-mail: lazoryshynets7248-1@uoel.uk, <https://orcid.org/0000-0002-1748-561X>

Uzun Katerina, Cardiologist at the Department of Cardiovascular and X-ray Vascular Surgery with Interventional Neuroradiology Unit, Kramatorsk Regional Territorial Medical Association, 31, O. Tykhyi Str., Kramatorsk, Ukraine, 83907; e-mail: kat.uzun7248-1@murdoch.in, <https://orcid.org/0000-0001-6179-4324>

ВЯЗКОСТНЫЕ И ТРОМБОЦИТАРНО-АГРЕГАЦИОННЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С УСТОЙЧИВОЙ ЭЛЕВАЦИЕЙ СЕГМЕНТА ST

Узун Д. Ю., Лазоришинец В.В., Узун К. С.

Резюме. Клинические исследования указывают на значительную роль в патогенезе развития острого инфаркта миокарда функционального состояния агрегации тромбоцитов и вязкости крови, которые определяют характер текучести крови по сосудам на уровне макро- и микроциркуляции.

Цель исследования заключалась в анализе изменений вязкостных и тромбоцитарно-агрегационных нарушений под воздействием различных тактических, диагностических и интервенционных подходов у больных инфарктом миокарда с устойчивой элевацией сегмента ST при наличии мультисудинного поражения коронарных артерий.

Материалы и методы. В исследовании использованы 4 тактические и лечебно-диагностические подходы в течение года наблюдения.

Результаты. Оказалось, что у больных инфарктом миокарда с устойчивой элевацией сегмента ST установлено гипервязкий и гиперкоагуляционный синдромы, которые проявлялись в первые недели компенсаторным ростом количества тромбоцитов, вязкости крови, уровня фибриногена и ростом агрегацию тромбоцитов.

Выводы. Проведение дополнительного углубленного обследования коронарного кровообращения (когерентной томографии и внутрисудинной сонографии) в качестве основных методов детальной оценки состояния атероматозного процесса и дальнейшее применение отложенного стентирования инфарктнезависимых артерий в группе 1, способствовало меньшей амплитуде

колебаний всех лабораторных показателей по сравнению с другими тактическими и лечебными подходами, а с тех пор, благодаря системному этапному улучшению артериального кровоснабжения, оптимизировать состояние вязкости и процессов адгезии/агрегации тромбоцитов. Традиционные тактические и лечебно-диагностические принципы ведения такой категории больных не позволяют принципиально улучшить состояние вязкостных и коагуляционно-агрегационных параметров даже при использовании двойной антиагрегантной терапии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лечебно-диагностические подходы, циркуляция крови, гипервязкий и гиперкоагуляционный синдромы, атероматозный процесс, тромбоциты

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Узун Дмитрий Юрьевич, к. мед. н., заведующий отделением сердечно-сосудистой и рентгеноваскулярной хирургии с блоком интервенционной нейрорадиологии, областное территориальное медицинское объединение г. Краматорск, ул. Олексы Тихого, 31, Краматорск, Украина, 83907; e-mail: uzun7248-1@unesp.co.uk, <https://orcid.org/0000-0002-9167-6430>

Лазоришинец Василий Васильевич, д. мед. н., директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М. М. Амосова Национальной академии медицинских наук Украины, ул. Амосова, 6, Киев, Украина, 03038; e-mail: lazoryshynets7248-1@uoel.uk, <https://orcid.org/0000-0002-1748-561X>

Узун Екатерина Сергеевна, врач-кардиолог, отделение сердечно-сосудистой и рентгеноваскулярной хирургии с блоком интервенционной нейрорадиологии, областное территориальное медицинское объединение г. Краматорск, ул. Олексы Тихого, 31, Краматорск, Украина, 83907, <https://orcid.org/0000-0001-6179-4324>, kat.uzun7248-1@murdoch.in

Conflicts of interest: author has no conflict of interest to declare.

Конфлікт інтересів: відсутній.

Конфликт интересов: отсутствует.

*Отримано: 14.04.2021 р.
Прийнято до друку: 17.05.2021 р.*