

РАЗДЕЛ 3

ХОЛОДИЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 663.26–026.562:504

Г.В. Крусяр

Одеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, Одеса, 65039

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Розглянуто питання аналізу твердих відходів виноробних підприємств в якості екологічних аспектів виноробних підприємств, а також зниження навантаження на навколишнє середовище за рахунок використання твердих відходів виноробства як вторинної сировини для отримання нового продукту. Наведено результати аналізу твердих відходів виноробних підприємств як цінної сировини для одержання кормової добавки. Доведено, що переважаючою речовиною хімічного складу вичавки і гребенів є углеводи, а саме целюлоза.

Ключові слова: Виноробство – Відходи – Екологія.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Рассмотрены вопросы анализа твердых отходов винодельческих предприятий в качестве экологических аспектов винодельческих предприятий, а также снижения нагрузки на окружающую среду за счет использования твердых отходов виноделия как вторичного сырья для получения нового продукта. Приведены результаты анализа твердых отходов винодельческих предприятий как ценного сырья для получения кормовой добавки. Доказано, что превосходящим веществом выжимки и гребней являются углеводы, а именно целлюлоза.

Ключевые слова: Виноделие – Отходы – Экология.

THE WINERY ECOLOGICAL ASPECTS

The issues of wineries solid waste analysis as the environmental aspects of the wineries, as well as reducing the burden on the environment through the use of wineries solid wastes as secondary raw material for the new product obtaining are considered. The results of the wineries solid waste analysis as a valuable raw material for feed additive obtaining are given. It is proved that the dominant substance of marc and crests chemical composition are carbohydrates, namely cellulose.

Keywords: Wine Making – Waste – Environment.

I. ВСТУП

Відомо, що виноград за вмістом корисних компонентів є найбагатшим представником багаторічних культурних рослин. Вагома частина складових винограду після його промислової переробки залишається у вторинних продуктах – відходах виноробства, основними видами яких є: вичавка, гребені, дріжджові і гущові осади, коньячна барда. Кількість вторинних продуктів (відходів) складають від 10 до 20% всієї кількості винограду, що переробляється.

Бурхливий розвиток високих промислових технологій, комп’ютеризації науки і виробництва дозволив останнім часом удосконалити способи переробки відходів виноробства і виробництво нової продукції з відходів виноробства. Однак, не зважаючи на це, до цього часу залишається гострою проблема утилізації вторинних сировинних ресурсів.

Основними відходами виноробної промисловості є гребені, що відокремлюються від грон ви-

нограду перед його пресуванням; вичавка, яку одержано після пресування винограду при виготовленні білих і рожевих вин; дріжджові осади, які осідають на дно бочок і резервуарів після бродіння, і осади, що виділяються після спиртування сусла і вина; винний камінь, який відкладається на стінках бочок при бродінні сусла і витримці вина. З них можна і потрібно, як у всіх розвинених виноробних країнах, виробляти затребувані ринком товари [1].

Одним з рішень проблеми утилізації відходів виноробства є переробка вичавки і гребенів в кормову добавку. Для успішного вирішення цієї задачі необхідно володіти детальною інформацією щодо хімічного складу відходів виноробства, які плануються до подальшої переробки.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Гроно винограду складається з м'якоті – джерела соку і займає 75-80% всієї кількості ягоди. Решта – суха частина, яка отримана після віджи-

мання соку (сусла), відноситься до твердої фази – вичавки. Вона об'єднує гребені, фрагменти шкірки, насіння і частинки пульпи діаметром до 3 мм. Вологість свіжовіджатої вичавки становить 48-55%, щільність – в межах 1,0-1,2 г /см³, вологосміність – 30-60 мл/100 г.

Вагове співвідношення складових частин у вичавці варіює в значному діапазоні і залежить від сорту винограду, з якого отримана вичавка, від метеорологічних умов року і від того, як і на яких пресах проводилося пресування, в середньому вагове співвідношення шкірки, гребенів та насіння складає 2:1:1 [2].

З 100 кг вичавки можна виділити відповідно 15-24 кг сухої шкірки, 21-26 кг насіння, а також потенційний спирт у кількості 2-7 л і винокислі сполуки – від 0,4 до 3,0 кг. Склад вичавки аналогічний складу винограду. У ній присутні ліпіди, азотисті сполуки, вода, вуглеводи, винокислі сполуки, фенольні речовини, вітаміни, органічні кислоти. Тому одним з найважливіших етапів досліджень було визначення хімічного складу виноградної вичавки та гребенів [3]. Результати визначення хімічного складу вичавки, одержаної після пресування, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1 – Хімічний склад вичавки

Група речовин	% в перерах. на СР
Ліпіди	5,5-9,0
Вуглеводи (в тому числі):	6,0-16,1
–моносахариди (глюкоза, маноза)	11,0-19,0
–целюлоза	16,1-27,2
–пектин	5,0-8,0
Білок (загальний)	14,0-15,0
Зола	1,0-1,5
Фенольні сполуки (загальні)	3,0-6,0

Як свідчать результати експериментальних досліджень, переважаюча речовиною хімічного складу вичавки є вуглеводи: целюлоза (16-27%) та пектинові речовини (5-8%). Відомо, що при гідролізі пектинових речовин утворюються уронові кислоти, які мають велике значення при знезараженні таких шкідливих речовин, як феноли [4].

Дані, які наведені в таблиці 1, показали, що виноградна вичавка є цінною сировиною для отримання кормової добавки для крупної рогатої худоби за вмістом у ній ліпідів, білків, вуглеводів, азотистих та інших сполук.

Серед поживних речовин вичавки велике значення має білок, який складає 14,0-15,0%. Біологічна цінність білку залежить від його амінокислотного складу [3]. Тому наступним етапом дослідження було вивчення амінокислотного складу вичавки. У таблиці 2 наведено вміст деяких амінокислот в виноградній вичавці.

В процесі досліджень амінокислотного складу встановлено, що виноградна вичавка багата такими критичними амінокислотами, як триптофан (7,2%) і лізин (7,5%), наявність яких сприяють на-

рошуванню маси і нормальній роботі обміну речовин тварин [5].

Таблиця 2 – Вміст деяких амінокислот у виноградній вичавці

Амінокислоти	% в перерах. на СР
Лізин	7,5
Метіонін	1,0
Цистин	0,7
Триптофан	7,2
Аргінін	5,1
Валін	7,2
Гістидин	3,5
Лейцин	6,2
Ізолейцин	5,6
Треонін	4,8
Фенілаланін	2,9

Як було зазначено вище, вичавка містить фрагменти шкірки і насіння у співвідношенні 2:1.

Тому одним з найважливіших етапів досліджень було більш детальне вивчення хімічного складу як насіння так і шкірочки, які входять до складу вичавки. Результати визначення хімічного складу насіння наведено у таблиці 3.

Таблиця 3 – Хімічний склад насіння

Група речовин	% в перерах. на СР
Ліпіди	15,9-16,8
Вуглеводи (в тому числі):	41,1-43,7
–моносахариди (глюкоза, маноза)	0,9-1,1
–целюлоза	24,3-25,5
Білок (загальний)	16,0-17,2
Зола	2,6-3,0

Вміст ліпідів у насінні значний (15,9-16,8%), тому важливо вивчення його жирно кислотного складу. З результатів досліджень наведених в таблиці 3 можна зробити висновок, що насіння винограду характеризується значним вмістом ліпідів (15,9-16,8%). Жирнокислотний склад ліпідної частини насіння, що входить до складу вичавки, наведено в таблиці 4.

Таблиця 4 – Жирнокислотний склад насіння

Жирна кислота	Вміст мг/100 г
Олеїнова кислота	3,4
Пальмітинова кислота	19,9
Стеаринова кислота	21,6
Лінолева кислота	1,3
Ліноленова кислота	1,1
Арахідонова кислота	19,0

У ліпідах, виділених з насіння винограду, міститься 87,0-93,0% фізіологічно цінних ненасичених жирних кислот, в тому числі лінолевої (1,3%), ліноленової (1,1%) олеїнової (3,4%), арахідонової кислот (19,0 %), які є основним джерелом запасного енергетичного матеріалу, виконують надзви-

чайно важливі фізіологічні функції в метаболізмі клітин, у ферментативних процесах [5].

Шкірочка складає в середньому 9-11% ваги виноградного грона. У ній знаходяться дубильні, барвні і частково ароматичні речовини, які відповідальні за колір, терпкість і аромат, що притаманний сорту винограду. Основна маса шкірочки складає від 60 до 80 % води, інша частина відведена вуглеводам, ліпідам, білкам та ін. [6]. Результати вивчення хімічного складу шкірочки наведено у таблиці 5.

Таблиця 5 – Хімічний склад шкірочки

Група речовин	% в перерах. на СР
Ліпіди	0,3-0,4
Вуглеводи (в тому числі):	29,0-30,0
–моносахариди (глюкоза, маноза)	61,0-62,0
–целюлоза	28,0-39,0
Білок (загальний)	5,1-5,8
Зола	1,0-1,7

Як свідчать результати експериментальних досліджень, шкірочка багата вуглеводами, які представлені геміцелюлозами (61,0-62,0%) та целюлозою (28,0-39,0%), але бідна ліпідами(0,3-0,4%) та білком (5,1-5,8%).

Гребені у винограді складають 3,8-8,5% маси грона (в середньому 5,5%) [7]. Відокремлені від ягід вологі гребені містять деяку кількість сусла, що змочує їх поверхню. Сусло можна відокремити пресуванням або промиванням гребенів водою. Його вихід становить 1 дал з 1 тонни переробленого винограду. Результати визначення хімічного складу гребенів, одержаних після пресування, наведено у таблиці 6.

Таблиця 6 – Хімічний склад гребенів

Група речовин	% в перерах. на СР
Ліпіди	0,1-0,3
Вуглеводи (в тому числі):	4,6-5,8
– целюлоза	18-31
– пектин	3,1-4,8
Білок (загальний)	2,1-2,4
Зола	1-1,4
Фенольні сполуки (загальні)	1-5,4

Як видно з даних, наведених у табл. 6, гребені, як і вичавка, є цінною сировиною для виробни-

цтва кормової добавки. Переважаюча речовина хімічного складу гребенів є вуглеводи, що містять переважно целюлозу (18-31%), та пектинові речовини (3,1-4,8%).

IV. ВИСНОВОК

Таким чином, аналіз твердих відходів виноробства (гребенів і вичавки) показав, що переважаюча речовина хімічного складу вичавки (шкірочки та насіння) та гребенів є вуглеводи, а саме целюлоза. Дані види відходів є цінною сировиною для отримання кормової добавки, тому що містять значну кількість поживних речовин, які в свою чергу збагачують раціон харчування тварин.

ЛІТЕРАТУРА

1. Крусири Г.В., Кирияк А.В., Соколова И.Ф. Экологические аспекты винодельческих предприятий // Екологічна безпека №2/2011(12). – Кременчук. – 2011. – С. 128-132
2. Брыкалов А. В., Белик Е. В., Антонова Н. А. Разработка технологии получения масла из косточек винограда // Сборник научных трудов «Современные достижения в химии и биотехнологии». – Ставрополь. – 2005. – С. 64 – 65.
3. Ермаков А.И., Арасимович В.В., Ярош Н.П., Перуанский Г.А., Луковникова Г.А., Иконникова М.И. Методы биохимического исследования растений // 3-е изд. Ленинград. – 1987. – С. 430.
4. Бареева Н.Н., Донченко Л.В. Виноградные выжимки – перспективный промышленный источник пектиновых веществ // Кубанский государственный аграрный университет №20(04). – Краснодар. – 2006. – С. 36–42.
5. Левицкий А.П., Чайка И.К., Ходаков И.В., Охрименко А.Н., Пужанская И.П., Дерменко П.П. Кормовая ценность зерно-виноградных экспресс-тестов // Зернові продукти і комбікорми №1. – Одеса. – 2011. – С. 32 – 34.
6. Коробко В.И. Виноградные выжимки – важный резерв кормов // Научный журнал «Наука, техника, технология». – Одесса. – 2002. – С. 64 – 66.
7. Карунский А.И., Дащковская О.П., Иванов А.П. Эффективность использования виноградных выжимок при производстве комбикормов // Наукові праці, випуск 24. – Одеса. – 2003. – С. 193–196.

Получена в редакции 15.05.2013, принятая к печати 04.06.2013