

Original article

Evaluation of the Association between Air Pollutants and Number of Cases with Severe Acute Respiratory Syndrome Recorded at Emergency Medical Centers in Tehran, Iran in 2013

Saeed Motasedi¹
 Sadegh Khazaei Soltanabadi^{2*}
 Kourosh Etemad³
 Yousef Rashidi⁴
 Hamid Gheybipour⁵
 Marzieh Rohani Rasaf⁶

- 1- PhD in Environmental Health, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
- 2- MSc in Environmental Health, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
- 3- PhD in Epidemiology, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
- 4- PhD in Environmental Health, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
- 5- MSc Student of Epidemiology, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
- 6- Epidemiology PhD Student, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

*Corresponding author: Sadegh Khazaei Soltanabadi, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Email: khazaei_sadegh96@yahoo.com

Received: 3 April 2016

Accepted: 25 June 2016

ABSTRACT

Introduction and purpose: Air pollution is an important risk factor for the environment and public health, associated with increased severity of respiratory diseases. This study aimed to evaluate the association between various air pollutants and number of cases with severe acute respiratory syndrome referred to emergency medical centers in Tehran, Iran in 2013.

Methods: In this ecological study, the relationship between air pollution and acute respiratory symptoms in patients referred to the emergency centers of Tehran in 2013 was assessed. In total, 36787 patients with acute respiratory symptoms has been registered in these centers. Data on the number of cases with acute respiratory symptoms and air pollutants of emergency centers and air quality monitoring stations were collected. Moreover, Poisson regression was used to assess the relationship between air pollutant concentrations ($PM_{2.5}$, SO_2 , NO_2 , O_3 , CO) and the number of cases with severe acute respiratory syndrome.

Results: The results of the current study demonstrated that CO (weekly average IRR=1.1) and SO_2 (three days average IRR=1.03 and weekly average IRR= 1.04) increased the risk of respiratory diseases 10%, 3%, and 4%, respectively. Consequently, longer duration of pollutants would increase the risk of respiratory syndromes.

Conclusion: According to the results of this study, increased air pollutant concentrations could be associated with escalated number of patients with acute respiratory symptoms referred to the emergency medical centers in Tehran.

Keywords: Air pollution, Respiratory disease, Tehran

► **Citation:** Motasedi S, Khazaei Soltanabadi S, Etemad K, Rashidi Y, Gheybipour H, Rohani Rasaf M. Evaluation of the Association between Air Pollutants and Number of Cases with Severe Acute Respiratory Syndrome Recorded at Emergency Medical Centers in Tehran, Iran in 2013. Journal of Health Research in Community. Summer 2016;2(2): 38-44.

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین آلودگی هوا و تعداد موارد با مشکل علائم حاد تنفسی ثبت شده در مرکز فوریت‌های پزشکی شهر تهران در سال ۱۳۹۲

چکیده

مقدمه و هدف: آلودگی هوا، یک ریسک فاکتور مهم محیطی برای جهان و سلامت عمومی محسوب می‌شود که با افزایش شدت و خامت بیماری‌های تنفسی همراه است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین آلاینده‌های مختلف هوا و تعداد بیماران مراجعه کننده با علائم حاد تنفسی به مرکز فوریت‌های پزشکی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ می‌باشد.

روش کار: در مطالعه اکولوژیک حاضر، ارتباط بین آلاینده‌های مختلف هوا و تعداد مراجعه کنندگان با مشکل علائم حاد تنفسی، در سال ۱۳۹۲ بررسی شد. در مرکز فوریت‌های پزشکی شهر تهران، تعداد ۳۶۷۸۷ نفر با مشکل علائم حاد تنفسی در سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده است. داده‌های مربوط به تعداد موارد با مشکل علائم حاد تنفسی و آلاینده‌های هوا از مرکز فوریت‌های پزشکی و ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا جمع‌آوری شدند. برای محاسبه ارتباط غلظت آلاینده‌ها (SO_2 , NO_2 , O_3 , $PM_{2.5}$ و CO) با تعداد موارد با مشکل علائم حاد تنفسی، از معادله رگرسیون پوآسون استفاده شد.

یافته‌های: یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان داد که آلاینده CO هفتگی 10 درصد ($IRR=1/10$) و آلاینده SO_2 سه روزه و هفتگی در شهر تهران، به ترتیب 3 و 4 درصد، خطر بروز بیماری‌های تنفسی را بیشتر می‌کند (IRR سه روزه و هفتگی: $1/03$ و $1/04$). با افزایش مدت زمان باقی ماندن آلاینده‌ها و تداوم آن‌ها که در این مطالعه به صورت سه روزه و هفتگی مورد بررسی قرار گرفته است، خطر بروز بیماری‌های تنفسی افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر، می‌توان بیان نمود که با افزایش غلظت آلاینده‌های هوا، تعداد بیماران با علائم حاد تنفسی مراجعه کننده به مرکز فوریت‌های پزشکی تهران نیز افزایش یافته است.

کلمات کلیدی: آلودگی هوا، بیماران تنفسی، تهران

سعید متصلی^۱

صادق خزایی سلطان آبادی^{۲*}

کوروش اعتماد^۲

یوسف رشیدی^۳

حیدر غیبی پور^۴

مرضیه روحانی رصف^۵

۱. دکترای بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۲. کارشناسی ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۳. دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۴. دکترای بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۵. دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

۶. دانشجوی دکترای تخصصی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: صادق خزایی سلطان آبادی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

Email: khazaei_sadegh96@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۴/۳

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۲۵

مقدمه

زودرس در سراسر جهان می‌باشد [۱,۲]. هدف اول اثرات زیان‌بار آلاینده‌های موجود در هوا، سیستم تنفسی است؛ به طوری که مواجهه با غلظت زیاد آلاینده‌های هوا، می‌تواند باعث تشدييد بیماری‌های

آلودگی هوا یک ریسک فاکتور مهم محیطی برای جهان و سلامت عمومی محسوب می‌شود که با افزایش هزینه‌های پزشکی و میرایی همراه است. برآورد می‌شود، این عامل علت 80000 مرگ

به اورژانس بهدلیل بیماری‌های مزمن انسداد ریوی مشخص گردید [۱۰]. مطالعه دهقان و همکاران نشان داده است که رابطه معناداری بین مونو اکسید کربن و تعداد بیماران قلبی-تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان‌های منتخب وجود دارد [۱۱]. هدف از پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل ارتباط بین آلودگی هوا و تعداد مراجعه کنندگان با علائم حاد تنفسی ثبت شده در مرکز فوریت‌های پزشکی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ می‌باشد.

روش کار

این مطالعه به روش مقطعی اکولوژیک و با استفاده از اطلاعات تعداد بیماران با مشکل علائم حاد تنفسی در روز به اورژانس‌های شهر تهران در سال ۱۳۹۲ و داده‌های آلودگی هوای شهر تهران صورت گرفته است. داده‌های خام تعداد بیماران تنفسی به دست آمده از بخش آمار مرکز اورژانس تهران پس از ورود به نرم‌افزار Excel براساس تاریخ بستری شدن بیمار و بر حسب سن و جنس به گروه‌های مردان و زنان بیشتر از ۶۰ سال و مردان و زنان کمتر از ۶۰ سال فیلتر و شمارش شدند. سپس پایگاه داده به صورت فایل Excel ایجاد گردید. اطلاعات مربوط به غلظت هوای تهران شامل: مونو اکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ازن، دی اکسید نیتروژن، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵ میکرون و ۱۰ میکرون بودند که طی سال ۱۳۹۲ با ۳۹ ایستگاه فعال سنجش آلودگی هوای انجام گردید که ۲۱ ایستگاه از ایستگاه‌های مذکور متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوا و ۱۸ ایستگاه متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد. برای محاسبه ارتباط غلظت روزانه آلاینده‌ها با تعداد بیماران از معادله رگرسیون پوآسون استفاده شد. بر این اساس غلظت میانگین روزانه هر یک از آلاینده‌ها با تعداد بیماران در همان روز محاسبه گردید. به منظور برآورد دقیق‌تر میزان تأثیر هر یک از آلاینده‌ها، در مرحله بعد غلظت میانگین سه روزه و هفتگی آلاینده‌ها با تعداد بیماران در همان بازه‌های زمانی بررسی شد. برای تعیین ارتباط میانگین غلظت

تنفسی گردد [۱]. آلاینده‌های موجود در هوا می‌تواند مرگ و میر و ابتلاء به بیماری‌های تنفسی را افزایش دهد [۳]. برآورد می‌شود که درصد بالایی از مرگ و میرهای شهر تهران را، بیماری‌های تنفسی قلبی تشکیل می‌دهد که این مشکلات با آلودگی هوای تهران رابطه مستقیم یا غیرمستقیم دارد [۲]. طبق نتایج مطالعه برآورد بار جهانی بیماری‌های ناشی از آلودگی هوای توسط سازمان جهانی بهداشت، ۸۹ درصد از کل مرگ‌های مربوط به آلودگی هوای در اثر بیماری‌های قلبی-تنفسی می‌باشد [۴]. براساس مطالعه Zhang و همکاران، بین مواجهه کوتاه‌مدت با آلاینده‌های هوای و بستری شدن در بیمارستان به علت بیماری‌های قلبی-تنفسی و آسم در گروه‌های سنی کودکان و سالمندان ارتباط معناداری دیده شد [۵]. نتایج Namdeo و همکاران نشان داد که بین تعداد افراد مسن بستری شده در اثر بیماری‌های تنفسی و O_{10} و رابطه مثبت وجود دارد [۶]. Chen و همکاران به بررسی روابط زمانی و مکانی بین آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق و تعداد بیماران بستری در اورژانس بیمارستان بریزین در استرالیا پرداختند. نتایج این مطالعه نشان‌دهنده ارتباط بین ذرات معلق و تعداد موارد بیماران در مناطق مختلف جغرافیایی بریزین می‌باشد [۷]. Makra و همکاران به بررسی ارتباط تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان در اثر حملات آسم با آلاینده‌های شیمیایی و زیستی هوادر کشور مجارستان پرداختند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ارتباط قوی بین تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان در اثر حملات آسم و غلظت میانگین روزانه آلاینده‌های هوای و میزان گرده گیاهی وجود دارد [۲]. براساس تحقیقات انجام‌شده در زمینه اثرات آلودگی هوای بیماری‌های تنفسی، ارتباط مستقیمی میان آلودگی هوای این بیمارها دیده شده است [۸]. Tao و همکاران در مطالعه خود، ارتباط چشمگیری بین آلودگی هوای و تعداد بیماران تنفسی مشاهده نمودند که این اثرات در مردان بالای ۶۵ سال بیشتر بود [۹]. Arbex و همکاران ارتباط بین آلودگی هوای شهری و مراجعه به اورژانس بیمارستان‌ها بهدلیل بیماری‌های انسداد مزمن ریوی را در تحقیق خود مدنظر قرار دادند. در این بررسی ارتباط بین مراجعه کوتاه‌مدت با آلاینده‌های هوای شامل PM_{10} و CO و مراجعه

جدول ۱: تعداد بیماران ثبت شده بر حسب فصول سال ۱۳۹۲

فصل	زمستان	پاییز	تابستان	بهار	تعداد بیماران ثبت شده
	۱۰۸۷۹	۱۰۱۴۹	۸۵۲۹	۷۷۱۵	

افزایش می‌یابد (جدول ۱). با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، بین غلظت آلاینده‌های بررسی شده و تعداد بیماران حاد تنفسی مراجعه کننده به اورژانس‌ها ارتباط معنادار وجود دارد (جدول ۲). شدت ارتباط بین غلظت هفتگی NO_2 بیشتر از غلظت‌های روزانه و سه‌روزه آن می‌باشد و ارتباط بین غلظت‌های NO_2 و SO_2 نسبت

سه روزه آلاینده‌ها با تعداد بیماران، از طریق مشخص نمودن میانگین سطح آلاینده مورد نظر به عنوان متغیر مستقل در بازه‌های زمانی سه روزه‌ایی که غلظت آلاینده مورد نظر بالا می‌باشد و برای محاسبه ارتباط غلظت هفتگی آلاینده‌ها با تعداد بیماران، از هفته‌هایی که میانگین غلظت آلاینده مورد نظر بالا است، به عنوان متغیر مستقل و معادله رگرسیون پوآسون استفاده شد [۱۲]. همچنین تعیین ارتباط بین تعداد بیماران تنفسی و غلظت آلاینده‌های هوا با کمک نرم‌افزار STATA 14 صورت گرفت (نسبت میزان بروز = IRR و فاصله اطمینان = CI).

یافته‌ها

جدول ۲: میانگین غلظت آلاینده‌های هوای شهر تهران به تفکیک فصل در سال ۱۳۹۲

آلاینده					
O_3	$\text{PM}_{2.5}$	SO_2	NO_2	CO	فصل
۲۵/۷	۲۸/۳۲	۱۹/۱۳	۳۱/۷	۲/۳	بهار
۲۲/۴	۳۷/۳۱	۱۵/۹۵	۴۰/۳۲	۲/۶	
۱۵/۸	۳۴/۱۱	۱۵/۷۳	۴۰/۵	۲/۷۵	
۳۸/۸	۱۹/۱۱	۴۱/۳۵	۲/۳۶		تابستان
واحد $\text{PM}_{2.5}$ بر حسب میلی گرم بر متر مکعب و سایر آلاینده‌ها بر حسب ppb است.					پاییز
					زمستان

در سال ۱۳۹۲ تعداد ۳۶۷۸۷ نفر، در اثر بیماری تنفسی در مرکز اورژانس تهران ثبت گردید که نسبت تعداد بیماران تنفسی ثبت شده در فصل‌های پاییز و زمستان از بهار و تابستان بیشتر بود. روند تغییرات تعداد بیماران تنفسی در طول سال، یک روند افزایشی داشته که نشان می‌دهد، با سرد شدن هوا و پدیده وارونگی دما و در نتیجه افزایش غلظت آلاینده‌ها در سطح زمین، تعداد بیماران تنفسی

جدول ۳: نتایج حاصل از رگرسیون پوآسون تأثیر آلاینده‌ها بر تعداد بیماران تنفسی روزانه، سه روزه و هفتگی

آلاینده	CO	O_3	NO_2	SO_2	$\text{PM}_{2.5}$
یک روزه *	IRR	.۰/۸۹۵	.۰/۹۸۴	۱/۰۰۳۴	۱/۰۱
	P> Z	.۰/...	.۰/...	.۰/...	.۰/۱۴۵
	CI	.۰/۸۶ - .۰/۹۲	.۰/۹۷ - .۰/۹۸	۱/۰۰ - ۱/۰۰	.۰/۹۹ - ۱/۰۰
سه روزه **	IRR	۱/۰۲۴۵	.۰/۹۹۳	۱/۰۰۸۴	۱/۰۲۷
	P> Z	.۰/۱۷۴	.۰/...	.۰/...	.۰/...
	CI	.۰/۹۸ - ۱/۰۶	.۰/۹۹ - .۰/۹۹	۱/۰۰ - ۱/۰۰	.۰/۹۹ - ۱/۰۰
هفتگی ***	IRR	۱/۱۰۴۸	.۰/۹۹۴۹	۱/۰۰۹۴	۱/۰۴۱۱
	P> Z	.۰/...	.۰/...	.۰/...	.۰/۵۳
	CI	۱/۰۶ - ۱/۱۵			

* نسبت افزایش تعداد بیماران تنفسی در روز، به ازای هر واحد افزایش در میانگین غلظت روزانه آلاینده‌ها می‌باشد.
** نسبت افزایش تعداد بیماران تنفسی در سه روز، به ازای هر واحد افزایش در میانگین غلظت سه روزه آلاینده‌ها می‌باشد.
*** نسبت افزایش تعداد بیماران تنفسی در هفته، به ازای هر واحد افزایش در میانگین غلظت هفتگی آلاینده‌ها می‌باشد.

در غلظت هفتگی زنان حساس تر از مردان می باشند. در مورد اثرات غلظت هفتگی، از غلظت سه روزه و روزانه NO_2 با تعداد بیماران تنفسی، می توان گفت که تأثیر غلظت هفتگی از غلظت سه روزه و روزانه بر روی تعداد بیماران تنفسی بیشتر می باشد. اثر NO_2 بر روی تعداد کل بیماران در غلظت روزانه، سه روزه و هفتگی معنادار بوده و با افزایش غلظت این آلاینده، تعداد بیماران تنفسی نیز، افزایش می یابد. نتایج به دست آمده از این مطالعه در مورد ارتباط مستقیم خطر بروز تعداد بیماران تنفسی با دو آلاینده SO_2 و NO_2 ، مطابق بسیاری از مطالعات در این زمینه می باشد؛ زیرا همان گونه که در مطالعات کنترل شده مشاهده گشته، NO_2 و SO_2 به عنوان تنگ کننده راه های هوایی کوچک عمل می کنند و آستانه تحريك افراد را نسبت به سایر محرك ها پایین می آورد [۱۵]. در برخی مطالعات اپیدمیولوژیک دیگر دیده شده که افزایش میزان SO_2 هوا به خصوص در فصول سرد سال و NO_2 بر افزایش میزان NO_2 مراجعین به علت حملات حاد آسم، اثر قابل توجهی داشته است؛ به طوری که نه تنها تعداد مراجعین آسمی با غلظت NO_2 همان روز؛ بلکه با غلظت NO_2 روز قبل و حتی دو روز قبل نیز، ارتباط معناداری را نشان داده است [۱۶-۱۸]. در مطالعه ای ارتباط بین آلاینده های هوای آزاد NO_2 ، SO_2 و PM_{10} با تعداد کل مراجعه کنندگان به بیمارستان در اثر بیماری های تنفسی و قلبی با روش Time-Series پرداخت شده، بین تعداد کل مراجعه کنندگان و غلظت آلاینده های گازی (NO_2 و SO_2) ارتباط وجود دارد که نشان داده شده تأثیر NO_2 در فصل سرد سال و SO_2 در فصل گرم سال بیشتر است [۱۹]. طی مطالعه ای که توسط دهقانی و همکاران در شیراز انجام شد، بین میانگین غلظت مونو اکسید کربن و پذیرش بیماران قلبی-عروقی در بیمارستان های منتخب شیراز رابطه معناداری مشاهده شد؛ ولی با سایر آلاینده های ازن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون رابطه معناداری مشاهده نگردید [۱۱]. مسجدی و همکاران به بررسی همبستگی آلودگی هوا با میزان حملات حاد قلبی و تنفسی تهران با روش رگرسیون چندگانه به روش Stepwise و Backward

به CO و $PM_{2.5}$ در ارتباط با تعداد بیماران تنفسی پذیرش شده در اورژانس ها باشد بیشتر مشاهده گردید (جدول ۳).

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه بین غلظت برخی از آلاینده ها و تعداد بیماران تنفسی در سال ۱۳۹۲ در شهر تهران ارتباط معنادار مشاهده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین غلظت CO و تعداد موارد بیماری تنفسی ارتباط معنادار وجود دارد که با افزایش هر ppm میانگین غلظت هفتگی CO ، ۱۰ درصد بیماری تنفسی افزایش می یابد و این افزایش، در مردان بیشتر است که می تواند به دلیل فعالیت بیشتر مردان در محیط باز و میزان فعالیت بیشتر مردان باشد. در مورد ارتباط غلظت روزانه و سه روزه این آلاینده با تعداد بیماران تنفسی، اثرات این آلاینده مشاهده نشده در واقع می توان این چنین بیان کرد که هرچه افراد مدت زمان بیشتری در تماس با این آلاینده باشند، اثرات این آلاینده بیشتر است. مطالعات بسیاری نشان می دهند که غلظت های بالای مونو اکسید کربن می تواند باعث تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک و در نهایت مرگ شوند. مشخص شده است که در معرض قرار گیری با غلظت های بالای مونو اکسید کربن (بیش از ۷۵۰ ppm) منجر به مرگ می شود. ترکیب مونو اکسید کربن با همو گلوبین سبب تشکیل کربوکسی همو گلوبین (COHB) و ترکیب اکسیژن با همو گلوبین منجر به تشکیل اکسی همو گلوبین (O_2HB) می شود [۱۳]. در مطالعه ای که به بررسی ارتباط بین غلظت CO ، SO_2 و دود با تعداد بیماران انسداد مزمن ریوی در بارسلونا انجام شد، بین تعداد بیماران و غلظت این آلاینده ها ارتباط وجود داشت [۱۴]. طبق نتایج به دست آمده برای اثرات SO_2 ، می توان بیان کرد که بین تعداد کل بیماران تنفسی و غلظت روزانه، سه روزه و هفتگی این آلاینده ارتباط وجود دارد که این ارتباط در غلظت هفتگی و سه روزه بیشتر از غلظت روزانه است و در گروه جنسی زنان و مردان در غلظت روزانه و سه روزه برابر و

بیماران انسداد مزمن ریوی و غلظت آلاینده‌های CO_2 ، SO_2 و دود ارتباط معنادار وجود داشت [۱۴]. Rossi و همکاران به این نتیجه رسیدند که بین خطر بروز حملات آسمی و NO_2 رابطه معنادار وجود دارد [۲۱]. Namdeo و همکاران بین تعداد بیماران تنفسی و غلظت PM_{10} و O_3 رابطه معناداری در بزرگسالان (۷۰–۷۹) به دست آورده‌اند و ارتباط CO در بزرگسالان (بیشتر از ۸۰ سال) معنادار بود؛ در حالی که ارتباط غلظت NO_2 با سن افراد رابطه عکس داشت و با افزایش سن تأثیر NO_2 کمتر بود [۲۲]. این مسئله می‌تواند تأییدی بر این ادعا باشد که یکی از عوامل افزایش رو به رشد موارد بیماری‌های تنفسی، آلودگی هوای مخصوص وجود آلاینده‌های محركی نظیر NO_2 و SO_2 حتی در مقادیر کمتر از استاندارد در هوای شهرهای بزرگ می‌باشد.

قدرتانی

حقیقین لازم می‌دانند از سازمان کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست تهران، مرکز اورژانس تهران و کلیه اساتید و همکارانی که به نحوی با راهنمایی‌های خود انجام این تحقیق را میسر نمودند، تشکر نمایند. این مقاله حاصل از پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد صادق خزایی سلطان آبادی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشد.

References

- Marino E, Caruso M, Campagna D, Polosa R. Impact of air quality on lung health: myth or reality? Ther Adv Chronic Dis 2015; 6(5):286-98.
- Makra L, Matyasovszky I, Bálint B. Association of allergic asthma emergency room visits with the main biological and chemical air pollutants. Sci Total Environ 2012; 432:288-96.
- Jiang XQ, Mei XD, Feng D. Air pollution and chronic airway diseases: what should people know and do? J Thorac Dis 2016; 8(1):E31-40.
- Samet JM, Zeger SL, Dominici F, Curriero F, Coursac I, Dockery DW, et al. The national morbidity, mortality, and air pollution study. Part II: morbidity and mortality from air pollution in the United States. Res Rep

پرداختند و هیچ ارتباط معناداری بین غلظت آلاینده‌ها و مراجعین در همان روز مشاهده نشد. تنها بین میانگین غلظت سه روزه آلاینده SO_2 با میانگین مراجعین آسم در طی همان سه روز ارتباط دارد و نیز میانگین غلظت هفتگی NO_2 با میانگین مراجعین آسم رابطه معناداری دارد. در این مطالعه ارتباط مستقیم تشدید حملات آسم با دو آلاینده SO_2 و NO_2 نشان داده است [۲۰]. Rossi و همکاران ارتباط بین شرایط آب و هوایی (دما، فشار، رطوبت و $(\text{TSP}, \text{NO}_2, \text{SO}_2, \text{H}_2\text{S})$ ، سطح آلاینده‌های هوای میزان پارندگی)، Stepwise بررسی قرار دادند که بین غلظت NO_2 و تعداد افراد با مشکل حمله آسمی ارتباط معنادار مشاهده نمودند [۲۱]. Walters و همکاران رابطه معناداری بین خطر بروز تعداد بیماران تنفسی کمتر از پنج سال و غلظت NO_2 به دست آورده‌اند [۱۸]. در مطالعه‌ای دیگر، Walters و همکاران به بررسی ارتباط بین آلودگی هوای تعداد بیماران آسمی پرداختند که در آن بین تعداد بیماران آسمی، بیماران تنفسی و غلظت SO_2 در فصل زمستان رابطه معناداری مشاهده شد. در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شده که بین اسپاسم برونژ ها در افراد طبیعی و SO_2 ارتباط معنادار وجود دارد که این واکنش در افراد آسمی در یک دهم غلظت اتفاق می‌افتد. در سال ۱۳۵۲ بر اثر غلظت بالای دی اکسید گوگرد و دوده، ۴۰۰۰ نفر دچار مرگ بر اثر بیماری‌های قلبی و تنفسی شدند [۱۷]. در مطالعه‌ای بین تعداد

- Health Eff Inst 2000; 94(Pt 2):5-70.
5. Zhang S, Li G, Tian L, Guo Q, Pan X. Short-term exposure to air pollution and morbidity of COPD and asthma in East Asian area: a systematic review and meta-analysis. Environ Res 2016; 148:15-23.
 6. Namdeo A, Tiwary A, Farrow E. Estimation of age-related vulnerability to air pollution: assessment of respiratory health at local scale. Environ Int 2011; 37(5):829-37.
 7. Chen L, Mengersen K, Tong S. Spatiotemporal relationship between particle air pollution and respiratory emergency hospital admissions in Brisbane, Australia. Sci Total Environ 2007; 373(1):57-67.
 8. Xing YF, Xu YH, Shi MH, Lian YX. The impact of PM_{2.5} on the human respiratory system. J Thorac Dis 2016; 8(1):E69-74.
 9. Tao Y, Mi S, Zhou S, Wang S, Xie X. Air pollution and hospital admissions for respiratory diseases in Lanzhou, China. Environ Pollut 2014; 185:196-201.
 10. Arbex MA, de Souza Conceição GM, Cendon SP, Arbex FF, Lopes AC, Moyses EP, et al. Urban air pollution and chronic obstructive pulmonary disease-related emergency department visits. J Epidemiol Community Health 2009; 63(10):777-83.
 11. Dehghani M, Anushiravani A, Hashemi H, Shamsedini N. Survey on air pollution and cardiopulmonary mortality in Shiraz from 2011 to 2012: an analytical-descriptive study. Int J Prev Med 2014; 5(6):734-40.
 12. Kaps M, Lamberson WR. Biostatistics for animal science. Wallingford, UK: CABI Publishing; 2004.
 13. Naddafi K. Air pollution: its origin and control. Tehran: Scientific and Cultural Organization of Nass; 2013 (Persian).
 14. Sunyer J, Antó JM, Murillo C, Saez M. Effects of urban air pollution on emergency room admissions for chronic obstructive pulmonary disease. Am J Epidemiol 1991; 134(3):277-86.
 15. Orehek J, Massari JP, Gaynard P, Grimaud C, Charpin J. Effect of short-term, low-level nitrogen dioxide exposure on bronchial sensitivity of asthmatic patients. J Clin Invest 1976; 57(2):301-7.
 16. Bates DV, Baker-Anderson M, Sizto R. Asthma attack periodicity: a study of hospital emergency visits in Vancouver. Environ Res 1990; 51(1):51-70.
 17. Walters S, Griffiths RK, Ayres JG. Temporal association between hospital admissions for asthma in Birmingham and ambient levels of sulphur dioxide and smoke. Thorax 1994; 49(2):133-40.
 18. Walters S, Phupinyokul M, Ayres J. Hospital admission rates for asthma and respiratory disease in the West Midlands: their relationship to air pollution levels. Thorax 1995; 50(9):948-54.
 19. Chen R, Chu C, Tan J, Cao J, Song W, Xu X, et al. Ambient air pollution and hospital admission in Shanghai, China. J Hazard Mater 2010; 181(1-3):234-40.
 20. Masjedi MR, Jamaati HR, Dokooohki P, Ahmadzadeh Z, Alinejad Taheri S, Bigdeli M, et al. The correlation between air pollution and acute respiratory and cardiac attacks. Res Med 2001; 25(1):25-33 (Persian).
 21. Rossi OV, Kinnula VL, Tienari J, Huhti E. Association of severe asthma attacks with weather, pollen, and air pollutants. Thorax 1993; 48(3):244-8.
 22. Namdeo A, Tiwary A, Farrow E. Estimation of age-related vulnerability to air pollution: assessment of respiratory health at local scale. Environ Int 2011; 37(5):829-37.