

УДК 616.72-002-097-07:616.151

## ОСОБЛИВОСТІ ЦИТОКІНОВОГО СПЕКТРУ КРОВІ У ХВОРИХ НА РЕАКТИВНИЙ АРТРИТ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕТІОЛОГІЇ, АКТИВНОСТІ ЗАПАЛЕННЯ ТА НАЯВНОСТІ АНТИГЕНУ HLA-B27

Хухліна О. С., Залявська О. В.\*

Буковинський державний медичний університет  
Театральна пл., 2, 58002, Чернівці, Україна  
(отримано 28.03.2013, надруковано 02.07.2013)

В роботі наведена оцінка залежності цитокінового профілю у хворих на реактивний артрит (РеА) від етіології, активності та наявності антигена HLA-B27. Показано пряму залежність кількості в крові прозапальних цитокінів від ступеня активності РеА та експресії HLA-B27 у хворих із коморбідним перебігом хронічного піелонефриту, і максимальне їхнє зростання на фоні загострення урогенітальної інфекції.

**Ключові слова:** реактивний артрит, хронічний піелонефрит, HLA-B27, цитокіни, запалення.

\* zalyavchuk@gmail.com

### Вступ.

В основі патогенезу реактивного артриту лежить дисбаланс цитокінів. Результати багатьох досліджень цитокінового профілю при реактивному артриті (РеА) суперечливі. Так, за даними деяких авторів, антибактеріальна Th1-імунна відповідь (продукція інтерферону гама (ІФ- $\gamma$ ), фактора некрозу-альфа (ФНП- $\alpha$ ), інтерлейкіну-2 (ІЛ-2), ІЛ-12 та ін.) при РеА знижена на користь Th2-імунної відповіді (синтез ІЛ-4, ІЛ-10 та ін.) [1, 2, 3]. Інші науковці вказують на переважання активації прозапальних цитокінів при цьому захворюванні [4, 5, 6, 7]. Таким чином, на даний час немасє єдиного погляду на імунозалежні механізми розвитку РеА, як і на тип домінуючої імунної відповіді.

### Мета дослідження.

Дослідити характер цитокінового профілю крові у хворих на реактивний артрит, у т.ч. на тлі урогенітальної інфекції, залежно від етіології, активності, характеру перебігу захворювання і наявності антигену HLA-B27.

### Матеріали і методи.

З метою оцінки цитокінового профілю було обстежено 38 хворих на РеА на тлі хронічної хвороби нирок (ХХН) I-II стадії з наявністю хронічного піелонефриту (ХП), у фазі загострення (1 група), 52,6% з яких склали жінки, 47,4% - чоловіки. Також було обстежено 12 хворих на РеА на тлі перенесеного

інтероколіту (2 група) та РеА не встановленої етіології (11 осіб) (3 група). Групи хворих були рандомізовані за віком, статтю, тривалістю та активністю захворювання. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб (ПЗО) відповідного віку і статі.

Для оцінки цитокінового статусу у обстежених хворих визначали вміст ІЛ-1 $\beta$ , ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-18, ІФ- $\gamma$ , ФНП- $\alpha$  і ІЛ-1Ra у сироватці крові методом твердофазового імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням моноклональних антитіл (набір раєктивів "Diacclone", Франція). У всіх хворих проводилось дослідження крові на наявність антигену HLA-B27 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Середній вік пацієнтів у роках становив  $32,2 \pm 1,8$ , середня тривалість захворювання в місяцях складала  $20,4 \pm 7,9$ . У 79% обстежених був виявлений HLA-B27. I ступінь активності РеА був діагностований у 44,7% хворих на РеА, II і III ступінь – у 55,3% хворих.

### Результати дослідження.

Рівень цитокінів у сироватці крові обстежених хворих на РеА коливався в широких межах (табл.1). Зокрема, у групі хворих на РеА вміст у крові ІЛ-1 $\beta$  перевищував значення у контрольній групі у 1,6 раза ( $p < 0,05$ ), що вказує на роль даного прозапального цитокіна у індукції запалення.

**Таблиця 1.** Вміст цитокінів у сироватці крові у хворих на реактивний артрит на тлі хронічного пілонефриту ( $M\pm m$ )

Показник	Хворі на PeA (n=38)	Контрольна група (n=20)		p
ІЛ-1 $\beta$ , пкг/мл	M±n	59,6±6,32	37,9±2,36	<0,05
ІЛ-4, пкг/мл	M±n	28,6±7,36	29,0±2,71	>0,05
ІЛ-6, пкг/мл	M±n	24,4±7,57	49,72±4,44	<0,05
ФНП- $\alpha$ , пкг/мл	M±n	49,46±7,72	32,18±3,1	<0,05
IФ- $\gamma$ , пкг/мл	M±n	46,71±6,22	28,2±2,31	<0,05
ІЛ-1Ra, пкг/мл	M±n	71,25±8,07	187±8,58	<0,05

Водночас, у хворих 1-ї групи та ПЗО спостерігалися близькі дані діапазону середніх значень вмісту у крові протизапального ІЛ-4 ( $p>0,05$ ). Вміст у крові IФ- $\gamma$  та ФНП- $\alpha$  статистично вірогідно перевищував показник у групі ПЗО відповідно у 1,7 та 1,5 раза ( $p<0,05$ ), у той час, як вміст у крові ІЛ-6 у хворих 1-ї групи був нижчий від показника у групі контролю у 2,0 рази ( $p<0,05$ ). Аналогічні зміни спостерігалися і при аналізі показника вмісту у крові ІЛ-1Ra, який був достовірно нижчий у порівнянні із контрольною групою у 2,6 рази ( $p<0,05$ ).

Таким чином, встановлено достовірне підвищення рівнів ІЛ-1 $\beta$ , IФ- $\gamma$  і ФНП- $\alpha$ , а також вірогідне зниження показників вмісту в крові ІЛ-1Ra та ІЛ-6 у групі хворих на PeA у порівнянні із групою контролю вказує на роль дисбалансу прозапальних цитокінів у розвитку PeA.

При вивченні залежності рівнів цитокінів від активності захворювання були встановлені наступні результати (табл.2).

Так, вірогідна залежність від ступеня активності PeA була встановлена у відношенні вмісту у крові цитокінів: ІЛ-4, ІЛ-6 і ФНП- $\alpha$ , який із зростанням активності запального процесу зростав (відповідно у 1,7 раза, 1,9 та 2,0 раза ( $p<0,05$ )), а вміст IФ- $\gamma$  – вірогідно зменшувався (у 1,3 раза ( $p<0,05$ )). Встановлена пряма кореляційна залежність між вмістом у крові цитокінів: ІЛ-4, ІЛ-6 і ФНП- $\alpha$  та вмістом у крові сіалових кислот (відповідно  $r=0,62$ ,  $r=0,70$ ,  $r=0,74$  ( $p<0,05$ )) та зворотна кореляційна залежність середньої сили у відношенні вмісту у крові IФ- $\gamma$  ( $r= -0,55$  ( $p<0,05$ )).

**Таблиця 2.** Вміст цитокінів у сироватці крові хворих PeA та хронічний пілонефрит залежно від активності захворювання ( $M\pm m$ )

Показники	Хворі на PeA	
	I ступінь активності PeA (n=17)	II-III ступінь активності PeA (n=21)
ІЛ-1 $\beta$ , пкг/мл	59,78±5,93	52,42±5,59
ІЛ-4, пкг/мл	21,36±2,05	35,25±4,23 *
ІЛ-6, пкг/мл	16,07±2,63	30,20±3,54 *
ФНП- $\alpha$ , пкг/мл	31,01±2,43	65,28±3,12 *
IФ- $\gamma$ , пкг/мл	52,29±4,39	40,66±3,48 *
ІЛ-1Ra, пкг/мл	64,47±3,81	77,66±4,35

Примітка: \* - відмінності вірогідні у порівнянні з показником у групі хворих на PeA із I ступенем активності ( $p<0,05$ ).

Аналіз результатів дослідження вмісту цитокінів у хворих на PeA на тлі хронічного пілонефриту залежно від наявності HLA-B27 дозволив виявити їх вищий рівень у групі HLA-B27(+) хворих (табл.3).

**Таблиця 3.** Вміст цитокінів у сироватці крові у хворих PeA та хронічний пілонефрит залежно від наявності гена гістосумісності HLA-B27

Показники	Хворі на PeA	
	HLA-B27(+) (n=29)	HLA-B27(-) (n=9)
ІЛ-1 $\beta$ , пкг/мл	64,96±2,23	52,91±2,02 *
ІЛ-4, пкг/мл	34,25±6,64	24,01±4,58
ІЛ-6, пкг/мл	31,01±2,96	18,12±2,75 *
ФНП- $\alpha$ , пкг/мл	56,04±2,48	42,2±1,39 *
IФ- $\gamma$ , пкг/мл	47,58±3,71	43,88±2,93
ІЛ-1Ra, пкг/мл	79,70±3,45	63,25±3,25 *

Примітка: \* - відмінності вірогідні у порівнянні з показником у групі хворих на PeA із наявністю гена гістосумісності HLA-B27 ( $p<0,05$ ).

Зокрема, у HLA-B27-позитивних пацієнтів було встановлено достовірно вищий показники вмісту прозапальних цитокінів ІЛ-1 $\beta$  ( $p<0,05$ ), ІЛ-6 ( $p<0,05$ ), ФНП- $\alpha$  ( $p<0,05$ ), антагоніста рецептора ІЛ-1 (ІЛ-1Ra) ( $p<0,05$ ) у порівнянні з HLA-B27-негативними пацієнтами. Водночас, статистично значимої залежності у відношенні рівня протизапального цитокіну ІЛ-4 і IФ- $\gamma$  ( $p>0,05$ ) у сироватці крові хворих у порівнянні між групами HLA-B27-позитивних та HLA-B27-негативних пацієнтів встановлено не було.

При порівнянні цитокінового профілю у хворих з різними етіологічними варіантами PeA було виявлено вищий вміст ІЛ-1 $\beta$  у пацієнтів 2-ї (на 22,2%, ( $p<0,05$ )) та 3-ї груп (на 15,9% ( $p>0,05$ )) у порівнянні з 1-ю групою хворих. Вміст у крові ІЛ-4 у хворих 1-ї групи був максимально пригніченим і суттєво нижчим від показника у хворих 3-ї групи (у 1,6 раза ( $p<0,05$ )). Максимальний вміст у крові ІЛ-6 серед груп порівняння був зареєстрований теж у 1-й групі хворих, який перевищив показники у 2-ї та 3-ї групах відповідно у 1,7 та 1,9 раза ( $p<0,05$ ). Водночас, максимальний вміст у крові ФНП- $\alpha$  у пацієнтів з PeA був встановлений у 3-ї групі порівняння, і на 32,6% перевищував показник у хворих на урогенітальні та постентероколітичні PeA ( $p<0,05$ ) (табл. 4). Зміни вмісту у крові ІФ- $\gamma$  у групах порівняння були невірогідні ( $p>0,05$ ). Водночас, максимальне пригнічення активності антагоніста рецепторів ІЛ-1 було встановлено у хворих 1-ї групи ( $p<0,05$ ), а максимальні значення у 3-ї групі хворих, які відрізнялися від даних у 1-й групі на 24,4% ( $p<0,05$ ), але були істотно нижчими від показника у контролі.

**Таблиця 4.** Вміст цитокінів у сироватці крові у хворих PeA залежно етіології

Показники	Хворі на PeA		
	Урогенітальні PeA (n=38)	Постентероколітичні PeA (n=12)	Хворі на PeA не встановленої етіології (n=11)
ІЛ-1 $\beta$ , пкг/мл	53,52±2,73	65,20±2,43 *	62,81±2,43
ІЛ-4, пкг/мл	21,73±1,62	27,46±2,14	35,5±2,52 *
ІЛ-6, пкг/мл	32,11±2,80	19,95±2,70 *	16,75±1,75 *
ФНП- $\alpha$ , пкг/мл	41,75±3,73	52,04±7,08	52,37±2,14 *
ІФ- $\gamma$ , пкг/мл	48,44±3,21	41,91±2,59	45,23±2,62
ІЛ-1Ra, пкг/мл	63,26±2,26	69,33±4,61	78,62±2,67 *

Примітка:

\* - відмінності вірогідні у порівнянні з показником у групі хворих на PeA із наявністю урогенітальної інфекції ( $p<0,05$ );

\*\* - відмінності вірогідні у порівнянні з показником у групі хворих на PeA після перенесеного ентероколіту ( $p<0,05$ ).

Важливо відмітити, що група HLA-B27(+) хворих на PeA з не встановленою етіологією потребують постійного динамічного спостереження в зв'язку із потенційною загрозою трансформації захворювання в інші варіанти серонегативних артритів та спондилоартропатій.

#### Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Отримані в даному дослідженні результати імунологічних змін у хворих на PeA різної етіології, в тому числі на фоні активації урогенітальної інфекції, дають основу для вивчення предикторного значення досліджуваних біомаркерів у механізмах взаємообтяження, хронізації захворювання та розвитку ранніх ускладнень.

#### Висновки.

1. Результати вивчення цитокінового статусу у хворих на реактивний артрит на тлі ХХН: Хронічного піелонефриту у фазі загострення урогенітальної інфекції свідчать про підвищення рівнів ІЛ-1 $\beta$ , ІФ- $\gamma$  і ФНП- $\alpha$ , а також вірогідне зниження показників вмісту в крові ІЛ-1Ra та ІЛ-6 у порівнянні із групою здорових осіб, що вказує на роль дисбалансу прозапальних цитокінів у розвитку PeA.

2. Встановлена пряма щільна кореляційна залежність вмісту у крові цитокінів: ІЛ-4, ІЛ-6 і ФНП- $\alpha$  від ступеня активності PeA на тлі хронічного піелонефриту та зворотна кореляційна залежність середньої сили у відношенні вмісту у крові ІФ- $\gamma$ .

3. Носійство HLA-B27 антигену у пацієнтів з реактивним артритом на тлі ХХН супроводжується достовірним зростанням показників вмісту прозапальних цитокінів ІЛ-1 $\beta$ , ІЛ-6, ФНП- $\alpha$ , антагоніста рецептора ІЛ-1 (ІЛ-1Ra) ( $p<0,05$ ) у порівнянні з HLA-B27-негативними пацієнтами.

4. У пацієнтів з реактивним артритом, що перебігав на тлі загострення урогенітальної інфекції, було встановлено максимальний вміст у крові ІЛ-6 та ІФ- $\gamma$  у порівнянні з показниками в групах хворих з реактивним артритом на тлі ентероколіту та не встановленої етіології, а також максимальне пригнічення експресії протизапального ІЛ-4 та активності антагоніста рецепторів ІЛ-1.

#### Список опрацьованої літератури:

- Lower level of synovial fluid interferon- $\gamma$  in HLA-B27-positive than in HLA-B27-negative

- patients with Chlamidia trachomatis reactive arthritis / [S. Bas, T.K. Kvein, N. Buchs [et al.] // Rheumatology. – 2003. – Vol. 3. – P. 461-467.
2. Braun J. Low secretion of tumor necrosis factor alpha, but no other Th1 or Th2 cytokines, by peripheral blood mononuclear cells correlates with chronicity in reactive arthritis / J. Braun, Z. Yin, I. Spiller [et al.] // Arthritis Rheum. – 1999. – Vol. 42, № 10. – P. 2039-2044.
  3. Penttinen M.A. HLA-B27 modulates nuclear factor κB Activation in human monocytic cells exposed to lypopolysaccharide / M.A. Penttinen, C.I. Holmberg, L. Sistonen, K. Granfors // Arthritis Rheum. – 2002. – Vol. 46, № 8. – P. 2172-2180.
  4. Rihl M. Alpha beta but not gamma delta T-cell clones in synovial fluids of patients with reactive arthritis show active transcription of tumor necrosis factor  $\alpha$  and interferon  $\gamma$  /

## **ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО СПЕКТРА КРОВИ У БОЛЬНЫХ НА РЕАКТИВНЫЙ АРТРИТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ЭТИОЛОГИИ, АКТИВНОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ И НАЛИЧИЯ АНТИГЕНА HLA-B27**

Хухліна О. С., Залівська О. В.

Буковинський юзударственний медичинський університет  
Театральна пл., 2, 58002, Чернівці, Україна

В работе представлена оценка зависимости цитокинового профиля у больных на реактивный артрит (РеA) от этиологии, активности воспаления и наличия антигена HLA-B27. Описано прямую зависимость количества провоспалительных цитокинов в крови от активности РеA и экспрессии HLA-B27 у больных с коморбидным течением хронического пиелонефрита, и максимальное их увеличение на фоне обострения уrogenитальной инфекции.

**Ключевые слова:** реактивный артрит, хронический пиелонефрит, HLA-B27, цитокины, воспаление.

## **PECULIARITIES OF BLOOD CYTOKINE SPECTRUM IN THE PATIENTS WITH REACTIVE ARTHRITIS DUE TO ETIOLOGY, INFLAMMATION ACTIVITY AND PRESENCE OF HLA-B27 ANTIGEN**

Khukhlina O. S., Zaliavskaya O. V.

Bukovinian State Medical University  
2, Theatralna Square, 58002, Chernivtsi, Ukraine

The aim of our study was to investigate the cytokine profile due to the etiology, inflammation activity, and presence of HLA-B27 antigen in the patients with reactive arthritis. The study showed a direct dependence of IL-4, IL-6 and the TNF- $\alpha$  on the degree of activity of ReA with chronic pyelonephritis. The presence of HLA-B27 antigen in the patients with reactive arthritis and chronic pyelonephritis accompanied by an increasing of proinflammatory cytokines such as IL-1 $\beta$ , IL-6, PNP- $\alpha$ , IL-1R in comparison with the HLA-B27-negative patients. The results of study demonstrated that maximum serum levels of IL-6 and IFN- $\gamma$  in the patients with reactive arthritis that occurred on the background of acute urogenital infection were significantly higher than in the other etiological cases of reactive arthritis.

**Keywords:** reactive arthritis, chronic pyelonephritis, HLA-B27, cytokines, inflammation