

5. Cheftel J.C. Review: High pressure: Microbial inactivation and food preservation / J.C. Cheftel // Food Sci. Technol. Int. – №1. – 1995. – P. 75 – 80.
6. Hayashi R., Kunugi S., Shimadsu S. A preservation of fruits and vegetables / R. Hayashi // High Pressure Bioscience (San – Ei Jupan, Co., Kyoto). – № 3. – 1994. – P. 51 – 58.
7. Palou E. High-pressure treatment in food preservation / Palou E., Lopez-Malo A., Barbosa-Canovas G. V., etc. // Handbook of Food Preservation, M. S. Rahman, ed. – 1999 – P. 533–575.
8. Shoji T. High pressure using in food / T. Shoji, H. Saeki // Processing foods, ser food Engineering and manufacturing. –1989. – Vol. 52. – P. 75–831.
9. Suzuki C. The protein denaturation by high pressure / C. Suzuki, K. Suzucki // Journal Biochem. – 1962. – Vol. 52. – P. 67–71.
10. Поздняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза продовольственных товаров: Учеб. – 2-е изд. испл. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. – 448 с.
11. Журавская Н.К. Исследование и контроль качества мяса и мясопродуктов / Журавская Н.К., Алешина Л.Т., Отряшенкова Л.М. - М.: Агропромиздат, 1985. – 296 с.

LENGTHENING THE SHELF LIFE OF POULTRY MEAT BY TREATMENT WITH HIGH HYDROSTATIC PRESSURE

L.G. Vinnikov, Ph.D., professor*, E-mail: vinnikova.luda@mail.ru
 I.A. Prokopenko, a graduate student*, E-mail: irina41079@mail.ru

A.D. Soletskaia, Ph.D., Associate Professor*, E-mail: anna-soletska@yandex.ru
 *Department of Technology of meat, fish and seafood

Odessa National Academy of Food Technologies, Kanatnaya str., 112, Odessa, Ukraine, 65039

Annotation. Microbiological, physicochemical and organoleptic studies that are used to determine rational modes of high pressure processing of poultry with a view to lengthening its shelf life have been conducted in the work. Food processing with high pressure allows to monitor the enzymatic processes, ensures inactivation of microorganisms, prevents the collapse of vitamins and other nutrients. Hydrostatic pressure acts simultaneously on all thickness of the product, resulting the duration of raw material's processing reduces, energy resources are saving.

The results of conducted researches allowed to determine the optimal modes of processing of poultry meat with high hydrostatic pressure. Rational mode of processing should be considered as processing at 225 MPa with duration of 30-60¹ s, which contributes to the lengthening of the period of storage of poultry meat under standard conditions in 2 times in comparison with control samples. Athermal processing with the developed modes complies organoleptic, microbiological and chemical indicators of freshness for chilled poultry.

Keywords: high hydrostatic pressure, poultry, shelf life.

References

1. Shubina G Sushhestvujut li sposoby prodlit' stroki hranenija ohlazhdennogo mjasa do 2 mesjacev i vyše. Mjasnoj biznes. 2013; 10: 42-44.
2. Sukmanov VA, Hazipov VA. Sverhvisokoe davlenie v pishchevyh tehnologijah. Sostojanie problemy : monografija. Doneec. gos un-t jekonomiki i torgovli im. M. Tugan-Baranovskogo. Doneck. 2003.
3. Knorr D Effects of high-hydrostatic-pressure processes on food safety and quality. Trends in Food Science and Technology. 1993; 4: 370-375.
4. Wilson DC High pressure sterilization. 34th Annual Meeting of the Institute of Food Technologist (New Orleans, LA, May., 1980; 12-15.
5. Cheftel JC Review: High pressure: Microbial inactivation and food preservation. Food Sci. Technol. Int. 1995; 1: 75 - 80.
6. Hayashi R, Kunugi S, Shimadsu S A preservation of fruits and vegetables. High Pressure Bioscience (San – Ei Jupan, Co., Kyoto) 1994; 3: 51-58.
7. Palou E, Lopez-Malo A, Barbosa-Canovas GV High-pressure treatment in food preservation. Handbook of Food Preservation, M. S. Rahman, ed. 1999; 533-575.
8. Shoji T, Saeki H High pressure using in food. Processing foods, ser food Engineering and manufacturing. 1989; 52: 75-831.
9. Suzuki C, Suzucki K The protein denaturation by high pressure. Journal Biochem. 1962; 52: 67-71.
10. Поздняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза продовольственных товаров: Учеб. – 2-е изд. испл. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999.
11. Zhuravskaya NK, Alehina LT, Otrjashenkova LM Issledovaniye i kontrol' kachestva mjasa i mjasoproduktov. M.: Agropromzdat, 1985.

Отримано в редакцію 02.06.2015
 Прийнято до друку 10.08.2015

УДК 637.51.033:579.864:579.264

ВПЛИВ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ НА ПОВЕРХНЕВУ МІКРОБІОТУ М'ЯСА

Л.Г. Вінникова, доктор технічних наук, професор*
 Г.В. Ямборко, кандидат технічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології і біотехнології**
 А.В. Кишена, аспірант, E-mail: andrey.kishena@mail.ru

*Одеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

**Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Анотація. У статті наведено результати дослідження впливу різних штамів молочнокислих бактерій роду *Lactobacillus plantarum* на можливість пригнічення власної патогенної мікрофлори м'яса. Проби охолодженого м'яса відбирали на виробничому підприємстві з різних частин туші яловичини (шейна частина, пашина, тазостегінова частина), оскільки ці ділянки є найбільш мікробально забрудненими. Пускання охолоджених продуктів (зокрема м'яса) відбувається насамперед внаслідок життєздатності великої кількості мікроорганізмів: бактерій, грибів (пліснів, дріжджів), вірусів та мікрапаразитів. У роботі для подовження строку зберігання продукту використовували альтернативні хімічні препарати – речовини мікробіологічного походження (бактеріоцини, ферменти). Визначені кількісний та якісний склад поверхневої мікрофлори м'яса. Встановлено антагоністичну дію молочнокислих мікроорганізмів на гнильнюю мікробіоту м'яса. За результатами дослідів доведено, що молочнокислі бактерії роду *Lactobacillus plantarum* можливі використовувати у мясній промисловості в якості біологічного бар'єру, що дозволить уповільнити розвиток патогенної мікрофлори.

Ключові слова: мікробіота м'яса, *Lactobacillus plantarum*, строк зберігання, антагоністична дія.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ НА ПОВЕРХНОСТНУЮ МІКРОБІОТУ МЯСА

Л.Г. Вінникова, доктор технічних наук, професор *
 Г.В. Ямборко, кандидат технічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології і біотехнології **

А.В. Кишена, аспірант, E-mail: andrey.kishena@mail.ru

* Одеська національна академія піщевих технологій, вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

** Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Аннотация. В статье приведены результаты исследований влияния различных штаммов молочнокислых бактерий рода *Lactobacillus plantarum* на возможность подавления собственной патогенной микрофлоры мяса. Пробы охлажденного мяса отбирали на производственном предприятии из разных частей туши говядины (шейная часть, паштина, тазобедренная часть), поскольку эти участки являются наиболее мікробиального загрязненными. Порча охлажденных продуктов (в частности мяса) происходит прежде всего в результате жизнедеятельности большого количества микроорганизмов: бактерий, грибов (плесени, дрожжи), вирусов и мікрапаразитов. В работе для продления срока хранения продукта использовали альтернативные химические препараты соединения – вещества мікробиологического происхождения (бактериоцины, ферменты). Определен количественный и качественный состав поверхностной микрофлоры мяса. Установлено антагонистическое действие молочнокислых микроорганизмов на гнилостную мікробіоту мяса. По результатам опытов доказано, что молочнокислые бактерии рода *Lactobacillus plantarum* можно использовать в мясной промышленности в качестве биологического барьера, что позволяет замедлить развитие патогенной микрофлоры.

Ключевые слова: микробиота мяса, *Lactobacillus plantarum*, срок хранения, антагонистический эффект.

Copyright © 2015 by author and the journal "Food Science and Technology".

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



DOI:10.15673/2073-8684.3/2015.50278

Вступ

Тривала забезпечення якості і безпечності продукції є першочерговою метою для спеціалістів м'ясної промисловості. Свіже м'ясо має досить обмежений термін зберігання, що створює труднощі для виробників і створює потенційну загрозу для споживачів. У зв'язку з цим збут м'ясної продукції територіально обмежений місцем виробництва і прилеглими регіонами, а транспортування і зберігання потребує особливих умов [1].

Термін зберігання м'ясних продуктів є важливим поняттям і необхідною вимогою сьогодні. Згідно визначення, яке прийняте Британським інститутом досліджень у галузі харчових технологій (UK Institute of

Food Science and Technology, IFST) [2] – це період часу, протягом якого харчовий продукт залишається безпечним; надійно зберігає свої характерні органолептичні, хімічні, фізичні, мікробіологічні і функціональні характеристики та відповідає наведеним даним про харчову цінність при його зберіганні в рекомендованих умовах.

Постановка проблеми

Виробництво м'ясних продуктів завжди було і залишається трудомісткою і високовартісною галуззю. Однак у процесі зберігання та реалізації м'ясні про-

дукти зазнають цілий ряд змін, до яких відноситься й обсіменення поверхні небажаної мікрофлорою.

Основними ініціаторами мікробних уражень поверхні м'ясних продуктів виступають цвілеві гриби і поверхнева мікрофлора, що володіють високою здатністю до споротворення. Саме ці мікроорганізми погіршують органолептичні показники продукції, викликають зміни в складі білків, жирів, продукують високотоксичні речовини.

Тому розвиток промислового виробництва ставить на перше місце проблеми збереження якості та збільшення термінів придатності м'ясо та м'ясопродуктів, а розробка нових способів та технологій подовження строків зберігання м'ясних продуктів представляє собою науковий та практичний інтерес [3].

Виходячи з вищеведенного методою даної роботи було вивчення здатності бактерій роду *Lactobacillus* пригнічувати розмноження мікроорганізмів, які спричиняють псування м'ясо.

Літературний огляд

Біотехнологічні процеси з використанням мікроорганізмів і ферментів уже на сучасному технічному рівні широко застосовуються у харчовій промисловості. Промислове вирощування мікроорганізмів, рослинних і тваринних клітин використовують для одержання активних сполук – ферментів, гормонів, амінокислот, вітамінів, антибіотиків, метанолу, органічних кислот (цитратової, лимонної, молочної). Частину традиційних промислових технологій замінюють технологіями, що передбачають застосування ферментів і мікроорганізмів [4].

Молочнокислі бактерії широко використовуються в багатьох галузях харчової промисловості. Завдяки утворенню великої кількості молочної кислоти, до якої самі вони в значній мірі толерантні, молочнокислі бактерії за підходящих умов можуть доволі швидко розмножуватись, витиснуючи інші мікроорганізми. По цій причині їх легко культивувати на елективних середовищах і легко виділяти.

У м'ясній промисловості молочнокислі бактерії є важливими при отриманні ферментованих ковбас, оскільки вони проявляють позитивний вплив на консистенцію і в'язкість ковбасного фаршу.

Одні з можливих способів дії молочнокислих мікроорганізмів, результатом якого є придушення небажаної її становлення певної мікрофлори, є вилідання антибактеріальних речовин, таких як органічні кислоти, діоксид вуглецю, перекис водню, діазетат, а також бактеріоцинів. Цим пояснюється їхня комплексна антибактеріальна дія, що дає можливість їх використовувати у якості природних консервантів продуктів харчування. Бактеріоцини педіококів, педіоцини, активні проти *Listeria* і мають значний потенціал у якості біоконсерванту для м'ясної промисловості [5].

Для ефективного застосування бактеріоцинів у харчовій промисловості необхідно оптимізувати процесування бактеріоцинів бактеріями, підвищити ак-

тивність і стабільність цих сполук, цілеспрямовано одержувати бактеріоцини із заданими властивостями. Молочнокислі бактерії *Lactococcus*, *Lactobacillus*, *Pediococcus*, *Leuconostoc*, утворюють антибактеріальні речовини, зокрема бактеріоцини, які можуть використовуватися для консервації їжі.

Висока пристосованість молочнокислих бактерій до умов нового середовища життя дозволяє їм розвиватися в м'ясо, м'ясних продуктах і розсолах.

Застосування селекціонованих рас відкриває перспективи для отримання виробів з новими цінними якостями (оригінальний смак, аромат, відповідний колір, консистенція). Даощільно, щоб виведені раси володіли можливістю активно подавляти шкідливу мікрофлору, що розвивається на м'ясних продуктах [6].

Потребує уваги вивчення м'ясо і м'ясних продуктів як середовища для розвитку молочнокислих організмів з метою оптимізації в них умов для максимального виявлення корисних функцій мікроорганізмів.

Основна частина

Метою роботи було вивчення здатності бактерій роду *Lactobacillus* пригнічувати розмноження мікроорганізмів, які спричиняють псування м'ясо.

М'ярова тканина здорових тварин теоретично має бути стерильною. Проте при забой тварин в умовах м'ясокомбінату м'ясо зазвичай містить різну кількість мікроорганізмів [7]. Ця мікрофлора може бути результатом ендогенного (приживленого) або екзогенного (після убійного) шляхів обсіменення. Ендогенне обсіменення органів і тканин здорових тварин відбувається в основному протягом життя тварин та пов'язане із зниженням природної опірності організму, яке відбувається під впливом різних неблагоприємних чинників. Джерелами екзогенного мікрофлорного обсіменення м'ясо слугують шкіра тварин, шлунково-кишковий тракт, устаткування, руки і одяг працівників, інструменти, повітря, вода. Ступінь екзогенного забруднення м'яса залежить насамперед від дотримання санітарних правил і технології оброблення туш [8].

Відповідно до сучасних нормативних документів у м'ясній промисловості регламентуються такі мікробіологічні показники: мезофільні аеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми, бактерії групи кишкової палички (представники родів *Escherichia*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Serratia*), умовнопатогені мікроорганізми (бактерії роду *Proteus*, коагулазонегативні стафілококи, *Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*) [9].

Згідно з результатами проведених досліджень бактеріологічні показники усіх проб сирого м'ясо за добою тварин взагалі задовільні та відповідають стандартам. Слід відмітити, що кількість МАФАНМ у всіх досліджуваних зразках не підвищувала допустимі величини, а нестандартними вважали одиничні проби внаслідок виявлення БГКП, бактерій роду *Proteus* (табл. 1).

Таблиця 1 – Показники мікробіологічного контролю охолодженого м'ясо

Найменування досліджуваного об'єкту	МАФАНМ	Кількість проб, в яких виявлені		
		БГКП	Бактерії роду <i>Salmonella</i>	Бактерії роду <i>Staphylococcus aureus</i>
М'ясо свіже (усі види забійних тварин) та охолоджене у відрubaх	1.10 ² -1.10 ³ (у межах норми)	1	-	-

Найчастіше із нестандартних проб виділяли бактерії родів *Klebsiella* і *Proteus*, а бактерій роду *Salmonella* і токсигенних стафілококів у жодній пробі виявлено не було. Що стосується виявлення БГКП, то основними мікроорганізмами цієї групи, були бактерії родів *Klebsiella* та *Enterobacter*.

М'ясо, отримане при забой здорових, угодованих, неутомлених тварин з дотриманням санітарних і технологічних вимог, зазвичай містить мікроорганізми лише на поверхні, що пов'язано з екзогенным обсімененням в процесі оброблення туші [10]. При вивченні якісного складу поверхневої мікрофлори охолодженого м'яса було визначено, що термофілі і частина мезофільних мікрофлор загинули, проте велика чисельність мезофілів залишилися у м'ясо. Такими є представники бактерій з роду *Bacillus* (рис. 1).

Також у встановленому температурно-вологоному режимі зберігання в охолодженому м'ясі активно розмножувалися неспоротворюючі грамнегативні палички роду *Pseudomonas* та *Achromobacter*, аеробні коки роду *Micrococcus*. Було визначено, що найактивніше розмножувалися бактерії роду *Pseudomonas*, які володіють антагоністичними властивостями відносно інших мікроорганізмів. Згідно літературним даним багато патогенних мікроорганізмів – золотистий стафілокок, сальмонела, збудник ботулізму зберігають життєздатність у охолодженому м'ясі [6], проте у наших дослідженнях дані мікроорганізми виявлені не були.




Рис. 1. Частота виявлення представників поверхневої мікрофлори охолодженого м'яса.

Домінуюча група поверхневої мікрофлори охолодженого м'яса – бактерії роду *Bacillus* були представленими грампозитивними короткими паличками із закругленими кінцями. Ендоспори оваліні, не перевищують розмір клітини, розташовані центрально (рис. 2).

Псування охолоджених продуктів (зокрема м'ясо) відбувається насамперед внаслідок життєдіяльності




Рис. 2. Мікроскопічний препарат
а) фарбований за методом Грама (x1000);
б) електронно-мікроскопічний (x4500).

На м'ясопептонному агарі (МПА) *Bacillus spp.* утворювали сухі, дробноморшкуваті, бархатисті, безбарвні або рожеві колонії з хвилястим краєм. Усі досліджувані штами роду *Bacillus* були грампозитивні, рухливі, не утворювали параспороальні кристали, характеризувалися здатністю до росту за 30–40 °С та його відсутністю за 5 °С, утворювали каталазу, росли у м'ясопептонному бульйоні (МПБ) з 2–10 % NaCl та pH 6,8, розкладали нітрати до нітрітів, не утилізували цитрат, не утворювали індол та були негативні за тестом Вогеса-Прокскуера. Характерною властивістю ізольованих 5 штамів *Bacillus spp.* була відсутність анаеробного росту.

Псування охолоджених продуктів (зокрема м'ясо) відбувається насамперед внаслідок життєдіяльності

великої кількості мікроорганізмів: бактерій, грибів, вірусів та мікрапаразитів. Дослідження властивостей харчових бактерій-патогенів свідчить про те, що вони проявляють стійкість до антибактеріальних агентів, технологічним режимам обробки і внесеним інгредієнтам. Для пригнічення або уповільнення розвитку різних мікроорганізмів застосовують традиційні методи, такі як холод, високі температури, антисептики, ультрафіолетове і радіоактивне опромінення, СВЧ-нагрівання, сублімаційну сушку, застосування біологічно активних речовин, ферментів або метаболітів мікроорганізмів [11].

Тому наступним етапом нашої роботи була перевірка антагоністичної дії молочнокислих бактерій, а

Таблиця 2 – Антагоністична активність досліджуваних лактобактерій

Індикаторний мікроорганізм	Діаметр затримки росту індикаторних мікроорганізмів, мм	<i>L. plantarum</i> ONU 12	<i>L. plantarum</i> ONUL 87	<i>L. plantarum</i> ONU 469	<i>L. plantarum</i> VTCCB 0921
<i>Bacillus spp.</i> 1	20,0 ± 1,4	19,0 ± 0,5	18,1 ± 1,5	17,0 ± 1,1	
<i>Bacillus spp.</i> 2	15,0 ± 1,2	7,4 ± 1,0	5,0 ± 0,5	14,2 ± 1,2	
<i>Bacillus spp.</i> 3	14,2 ± 1,2	8,1 ± 1,4	10,3 ± 1,3	14,0 ± 1,6	
<i>Bacillus spp.</i> 4	15,3 ± 1,7	7,0 ± 1,3	13,0 ± 1,2	17,5 ± 1,1	
<i>Bacillus spp.</i> 5	13,5 ± 1,4	13,3 ± 1,2	14,0 ± 1,1	11,2 ± 1,4	

Як видно з даних, наведених у таблиці 2, штам *L. Plantarum* ONU12, ізольований з виноградного сусла, володів максимальною антагоністичною

активністю по відношенню до індикаторних мікроорганізмів. Діаметр зони затримки росту варіював від 13,5 ± 1,4 до 20,0 ± 1,4 мм (рис. 3).




Рис. 3. Зони затримки росту дослідженнями штамами *Lactobacillus plantarum* ONU469 (1), *Lactobacillus plantarum* ONUL12 (2), *Lactobacillus plantarum* VTCCB 0921 (3), *Lactobacillus plantarum* ONUL 87 (4): а) *Bacillus spp.* 1, б) *Bacillus spp.* 2 в) *Bacillus spp.* 3.

Висновки

Згідно з результатами проведених досліджень бактеріологічні показники усіх проб сирого м'яса забойних тварин взагалі задовільні та відповідають стандартам. Слід відмітити, що кількість МАФАНМ у всіх досліджуваних зразках не підвищувала допустимі величини, а нестандартними вважали одиничні проби внаслідок виявлення БГКП, бактерій роду *Proteus*. Найчастіше всього із нестандартних проб видили бактерії родів *Klebsiella i Proteus*, а бактерій роду *Salmonella* і токсигенних стафілококів у жодній пробі виявлено не було. Що стосується виявлення

збільшення терміну зберігання та контролю мікробіологічного забруднення м'яса та м'ясопродуктів.

Список літератури:

- Баранова Е. В. Повышение устойчивости стартовых культур к замораживанию и термической обработке / Е. В. Баранова // Мясная индустрия.– № 9 Сентябрь.– 2009, с. 70–72.
- Jeremiah L. E. Extension of Chilled Pork Storage Life, Agri-Food Canada Research Center / L. E. Jeremiah // National Pork Producers Council.– № 4/97.– Р. 1–8.
- Машнцева Н.Г Создание функциональных бактериальных препаратов для мясной промышленности / Н. Г. Машнцева // Мясная индустрия.– 2008.– №1 Январь.– С. 26–29.
- Gagri A. Antimicrobial edible films and coatings / A. Gagri, Z. Ustunol, E. T.// Journal of Food Protection, – vol 67, №4 – 2004.– P. 833–848.
- Navratilova P. Prevalence of *Listeria monocytogenez* in milk, meat and foodstuff of animal origin and phenotype of antibiotic resistance of isolated strains / P. Navratilova, J. Schlecelova, A. Sustackova, E. Napravnikova, E. Lukasova, E. Klimova // Vet. Med.– 2004.– № 7.– P. 243 – 252.
- Кузнецова Л.С. Состав пlesenевых грибов, поражающих поверхность мясной продукции / Л.С. Кузнецова, Н.В. Михеева, Е.В. Казакова // Мясная индустрия.– №3 Март.– 2009.– С. 28–31.
- Vogel R. F. et al. The competitive advantage of *Lactobacillus curvatus* LTH 1174 in sausage fermentation is caused by formation of curvacin // A. Syst Appl Microbiol.– 1993.– 16: 3: 457–462.
- Caplice E., Food fermentations: Role of microorganisms in food production and preservation. Int [Text] / E. Caplice, G. Fitzgerald. // J. Food Microbiol. – 1999.– № 50. – P. 131–149.
- Егоров Н. С. Микробы-антагонисты и биологические методы определения антибиотической активности. – М.: Высшая школа, 2009. – С. 28 – 49.
- Cagri A., Osburn Inhibition of *Listeria monocytogenez* on hot dogs using antimicrobial whey protein-based edible coatings / A. Cagri, Z. Ustunol. // Journal of Food Protection.– Vol. 68, №2.– 2003.– P. 291–299.
- Костенко Ю.Г. Санітарно-мікробіологічні аспекти виробництва охолодженої свинини з довготривалою строком годності / Ю.Г. Костенко, Д.С. Багаєва, М.А. Краснова // Мясная индустрия.– №4, Сентябрь.– 2014.– С. 66–67.

DETERMINE THE EFFECT OF LACTICACIDBA CTERIAON THE SURFACE MICRO FLORA OF MEAT

L.G. Vinnikov, Ph.D., professor *

G.V. Yamborko, Ph.D., assistant professor of microbiology, virology and biotechnology **

A.V. Kyshenya, a graduate student, E-mail: andrey.kyshenya@mail.ru

* Odessa National Academy of Food Technologies, Kanatnaya str, 112, Odessa, Ukraine, 65039

** Odessa National University II Mechanikov

Annotation. This paper presents the results of research concerning the possible impact of different strains of lactic acid bacteria of the family *Lactobacillus plantarum* on suppressing the meat's own pathogenic microflora. Specimens of chilled meat were collected on the production plant from different parts beef carcass (middle neck, flank, hip), because microbial contamination of these parts is considered to be the highest one. Qualitative and quantitative composition of the surface microorganisms of meat was established. The antagonistic effect of lactic acid on saprophytic microbiota of meat was identified.

Spoilage of refrigerated products (especially meat) occurs primarily as a result of vital activity of a great number of microorganisms: bacteria, fungi (mold, yeast), viruses and microparasites. Today, to preserve the product, innovative technologies are needed. An alternative to chemical drugs (benzoic acid, sorbic acid, etc.) are substances of microbial origin – bacteriocins, enzymes.

The research findings show that lactic acid bacteria of *Lactobacillus plantarum* family can be used in meat industry as a biological barrier will slow down the development of pathogenic microflora.

Keywords: microbiota of meat, *Lactobacillus plantarum*, shelf life, antagonistic effect

References

- Baranova EV Povyishenie ustoychivosti startovyih kultur k zamorazhivaniyu i termicheskoy obrabotke. Myasnaya industriya. 2009; 9: 70-72.
- Jeremiah LE Extension of Chilled Pork Storage Life. Natinoal Pork Producers Couill. 1997; 4: 1-8.
- Mashncheva NG Sozdanie funktsionalnyih bakterialnyih preparatov dlya myasnoy promyshlennosti. Myasnaya industriya. 2008; 1: 26-29.
- Gagri A, Ustunol Z, Ryser ET Antimicrobial edible films and coatings. Journal of Food Protection. 2004; 67: 833-848.
- Navratilova P, Schlecelova J, A. Sustackova, E. Napravnikova, E. Lukasova, E. Klimova E Prevalence of *Listeria monocytogenez* in milk, meat and foodstuff of animal origin and phenotype of antibiotic resistance of isolated strains. 2004; 7: 243-252.
- Kuznetsova LS, Miheeva NV, Kazakova EV Sostav Plesnevyih gribov porazhayushchih poverhnost myasnoy produktii. Myasnaya industriya. 2009; 3: 28-31.
- Vogel R, Pohle B, Tichacek PS The competitive advantage of *Lactobacillus curvatus* LTH 1174 in sausage fermentation is caused by formation of curvacin / A. Syst Appl Microbiol. 1993; 3: 457-462.
- Caplice E Food fermentations: Role of microorganisms in food production and preservation. Food Microbiol. 1999, 50: 131-149
- Egorov NS Mikroby-antagonistyi i biologicheskie metody opredeleniya antibioticheskoy aktivnosti. – M.: Vysshaya shkola; 2009.
- Cagri Z Ustunol W Osburn Inhibition of *Listeria monocytogenez* on hot dogs using antimicrobial whey protein-based edible coatings. Journal of Food Protection. 2003; 66: 291-299.
- Kostenko YuG Bataeva DS Krasnova MA Sanitarno-mikrobiologicheskie aspekty proizvodstva ohlazh-dennoy svinyiny dlitelnogo sroka godnosti. Myasnaya industriya. 2014; 4: 66-67

Отримано в редакцію 1.06.2015

Прийнято до друку 3.08.2015